



PROVINCIA DE SANTA FE  
Ministerio de Salud

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE BIOQUÍMICA, FARMACIA Y DROGUERÍA CENTRAL

Santa Fe, 26 de Abril de 2011

## PROGRAMA PROVINCIAL DE FARMACOVIGILANCIA

### BOLETÍN INFORMATIVO: Nº 6/11

## MEDICAMENTOS CON ERGOTAMINA DEBEN CONSUMIRSE BAJO PRESCRIPCIÓN MÉDICA

#### ANMAT RECUERDA:

Teniendo en cuenta que se han recibido algunos reportes de efectos adversos graves relacionados con el **principio activo ergotamina**, la ANMAT recuerda a la población y a los profesionales de la salud que los medicamentos que contienen dicha droga se encuentran autorizados como **venta bajo receta**, por lo que **su administración debe producirse bajo exclusiva prescripción médica**.

En efecto, entre los años 2007 y 2010, el Sistema Nacional de Farmacovigilancia recibió ocho notificaciones de reacciones adversas ocasionadas por especialidades medicinales que contienen ergotamina, un principio activo indicado para el tratamiento de dolores de cabeza y migrañas. En varios casos, los pacientes debieron ser hospitalizados.

Algunos de los reportes recepcionados daban cuenta de la interacción de la droga mencionada con el principio activo ritonavir, el cual se encuentra indicado para el tratamiento del HIV. En tal sentido, cabe destacar que el consumo crónico de ergotamina, o su administración junto con antirretrovirales inhibidores de las enzimas del citocromo P450, como el ritonavir, puede provocar una reacción adversa grave denominada ergotismo. Ésta se caracteriza por una vasoconstricción periférica cuyos síntomas son ausencia de pulso, frialdad, parestesias y dolor intenso de los miembros inferiores y/o de las manos.

Por todo lo expuesto, se desaconseja el uso de la ergotamina en forma prolongada o asociado a antirretrovirales.

**Comunicado ANMAT:** <http://www.anmat.gov.ar/comunicados/Ergotamina.pdf>

Debe evitarse el uso de ergotamina con inhibidores de la isoenzima 3 A 4 citocromo P450 (CYP3A) como antibióticos macrólidos (p.ej. eritromicina, claritromicina), antirretrovirales inhibidores de la proteasa o de la transcriptasa inversa (p.ej. ritonavir, indinavir, nelfinavir,

Dirección de Bioquímica, Farmacia y D.C.  
Bv. Dr. José Manuel Gálvez 1563  
S3000AAG - Santa Fe Tel:( 0342 ) - 4573710 / 3713 / 1930  
email:farmacovigilancia\_dbyfcia@santafe.gov.ar



PROVINCIA DE SANTA FE  
Ministerio de Salud

**DIRECCIÓN PROVINCIAL DE BIOQUÍMICA, FARMACIA Y DROGUERÍA CENTRAL**

Santa Fe, 26 de Abril de 2011

amprenavir) o antifúngicos azólicos (p.ej. ketoconazol, itraconazol, voriconazol) ya que puede provocar un aumento de la exposición a ergotamina y por tanto de su toxicidad pudiendo aparecer cuadros de vasoespasmo e isquemia de las extremidades, de las arterias coronarias o accidentes cerebrovasculares. No se conocen interacciones farmacocinéticas que impliquen otros isoenzimas del citocromo P450.

<b>Especialidades médicas comercializadas en Argentina, que contienen ergotamina</b>
<b>CAFERGOT • NOVARTIS</b>
<b>CEFALEX PLUS • BAGO</b>
<b>IBUPIRAC® MIGRA • PFIZER Comprimidos</b>
<b>IBU-TETRALGIN • CRAVERI</b>
<b>INTEGROBE PLUS • NORTHIA</b>
<b>MIGRADORIXINA • ROEMMERS Comprimidos Recubiertos</b>
<b>MIGRA-DIOXADOL • BAGO</b>
<b>MIGRAL • MONTPELLIER Supositorios</b>
<b>MIGRAL 500 • MONTPELLIER Comprimidos Recubiertos</b>
<b>MIGRAL COMPOSITUM • MONTPELLIER Comprimidos Recubiertos</b>
<b>MIGRAL II • MONTPELLIER Comprimidos Recubiertos</b>
<b>MIKESAN • BALIARDA Comprimidos</b>
<b>SOLACIL • MICROSULES ARGENTINA</b>
<b>TETRALGIN • CRAVERI</b>
<b>TETRALGIN NOVO • CRAVERI</b>

**Fuente:**

Consulta de Medicamentos: <http://www.anmat.gov.ar/Medicamentos/basedat.asp>

Micromedex

Ficha técnica: <http://www.aemps.es>

**SE RECUERDA:**

Que puede realizar **NOTIFICACIÓN ON LINE EN EL PORTAL DE SANTA FE**  
ingresando directamente en: <http://salud.santa-fe.gov.ar/farmacovigilancia/>