



ATENCIÓN
cargar 0,7 ml del diluyente y reconstituir con soluto liofilizado y cargar 0, 5 ml de lo reconstituido 0,5ml y aplicar por vía Subcutánea

Varicella Vaccine-GCC®

Vacunas a virus vivo atenuado
Presentación:
2 Frascos para preparar 1 dosis (1 con polvo liofilizado y 1 con diluyente)



Vía de ADMINISTRACIÓN SUBCUTÁNEA



¡Antes de administrar la vacuna recuerde realizar las siguientes preguntas!

- ¿Es alérgico? ¿A qué?
- ¿Está haciendo o hizo algún tratamiento médico? ¿Cuál?
- ¿Recibió transfusiones de sangre o derivados? ¿Cuándo?
- ¿Convive con alguien enfermo actualmente?
- ¿Qué enfermedad tiene?
- ¿Tuvo alguna reacción luego de aplicarse vacunas? ¿A qué vacuna?
- ¿Qué tipo de reacción?
- ¿Tuvo reacciones alérgicas? ¿Qué tipo de reacción? ¿Qué las causó?

-Confirme que es la vacuna indicada.
-Compruebe que no presenta signos de deterioro (envase roto, mal aspecto, etc.) y que su fecha de caducidad no esté superada

Pasos previos:

- 1** a) Lávese las manos
b) Tome la vacuna a administrar y el diluyente
c) Seleccione jeringa y aguja 25/8
- 2** Para reconstituir la vacuna, utilizar solamente el diluyente proporcionado.
- 3**  Administre la vacuna con la técnica correcta, inmediatamente después de reconstituida.
- 4** Descarte la aguja en un contenedor de cortopunzante y la jeringa en bolsa roja

REGISTRE la dosis aplicada!!!

Consultas

santafevacuna@yahoo.com.ar