

Es una varilla flexible del tamaño de un fósforo que se coloca debajo de la piel, generalmente en el brazo, para prevenir embarazos no intencionales y **tienen la misma eficacia que la ligadura de trompas, la vasectomía y el DIU.**

En la provincia de Santa Fe, el implante está disponible para las personas de cualquier edad que sean usuarias del sistema público de salud y no cuenten con ninguna cobertura de salud.

¿Qué recomendaciones debés tener en cuenta antes de colocarlo?

El implante puede traer cambios en el ciclo menstrual: falta de sangrado o sangrado irregular. Esto hace que las gestaciones muy tempranas, que no fueron detectadas en el momento de la colocación, se diagnostiquen en etapas más avanzadas.

Conversá siempre con el equipo de salud sobre la importancia de hacerte un test de embarazo antes de la colocación.

1°

Turno para colocación

Día: _____
 Hora: _____
 Médica/o: _____
 Lugar: _____
 Número de teléfono: _____
del centro de salud u hospital

¿Qué cuidados debés tener en cuenta después de colocarlo?

Mantené el área del implante limpia y seca, lavando con agua jabonosa y secando con una toalla limpia. No es necesario que cubras la zona ni que tengas otros cuidados (El equipo de salud te dará otras indicaciones que puedan ser importantes).

¿Qué molestias podés tener durante los primeros días de colocación?

Pueden aparecer dolor, ardor, hematomas (moretones) o enrojecimiento en la zona de colocación.

Medicamentos y el implante

Si necesitás tomar algún medicamento, avisá siempre que tenés un implante colocado. Algunos tratamientos, como los usados para tuberculosis, VIH o ciertos anticonvulsivantes, pueden disminuir su eficacia. El equipo de salud te va a orientar.



¿Cuándo comienza el efecto anticonceptivo?

El efecto anticonceptivo comienza a los siete días de la colocación, por lo que es necesario que hables con el equipo de salud sobre cómo cuidarte durante esa primera semana.

Si tuviste relaciones durante los primeros siete días luego de la colocación sin ninguna otra protección, tendrías que tomar la anticoncepción de emergencia lo antes posible.

¿Cuándo debés hacerte el control luego de la colocación?

Es muy recomendable que consultes al mes de la colocación y que lleves anotadas las preguntas que tengas para asesorarte con el equipo de salud.

2°

Turno para control

Día: _____
 Hora: _____
 Médica/o: _____
 Lugar: _____

¿Durante cuánto tiempo podés tener el implante colocado?

Una vez colocado, el efecto anticonceptivo es de **5 años**. Según el tipo y la marca de implante el equipo de salud te informará la duración del implante que te coloques. La extracción del implante debe ser realizada por una persona entrenada para sacarlo y si decidís continuar con el método, podés colocarte otro inmediatamente.

3°

Nombre de quien realizó la colocación: _____
 Tipo de implante colocado: _____
 Fecha colocación: _____
 Fecha aproximada de extracción: _____

¿Es recomendable sacarlo antes de la fecha sugerida?

Sí. Si el implante tiene efectos con los que no te sentís cómoda y que no pueden solucionarse, si deseás buscar un embarazo, o apareciera algún riesgo para tu salud se puede retirar en el momento que quieras.

Sangrado irregular: ¿qué hacer?

Es habitual que durante los primeros meses aparezca sangrado irregular. En la mayoría de los casos se regula solo o desaparece con el tiempo. Si el sangrado continúa y genera molestias, es importante **consultar al equipo de salud.**

Cambios en el sangrado

Después de colocar el implante, el sangrado puede cambiar. Al principio puede ser irregular o más abundante, y con el tiempo suele disminuir o incluso desaparecer. No tener sangrado es normal y **no afecta la salud.**

¿Cuánto se tarda en recuperar la fertilidad?

La fertilidad se recupera inmediatamente al retirar el implante. Por lo tanto, si lo retirás y no deseás un embarazo, conversá con el equipo de salud sobre otros métodos anticonceptivos disponibles.



■ ¿Cuándo consultar al centro de salud?

- Si aumentan el dolor o la hinchazón o la zona se pone roja y caliente
- Si supura algún líquido en la zona del implante.
- Si tenés un moretón oscuro que aumenta de tamaño
- Si tenés fiebre
- Si no podés tocar el/las varillas del implante
- Si ves que el implante se asoma por fuera de la piel
- Si no te hiciste un test de embarazo antes de colcarte el implante




Importante: Recordá que **los implantes anticonceptivos no previenen el VIH/SIDA ni las infecciones de transmisión sexual (ITS).**

Por lo tanto, se recomienda usar siempre preservativo (para pene o vagina)



Si tenés dudas o necesitás orientación para saber a dónde ir podés llamar a la Línea Nacional de Salud Sexual

0800-222-3444 Es gratuito y confidencial



Implante Anticonceptivo Subdérmico