



PROVINCIA DE SANTA FE
Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado
Instituto Provincial de Estadística y Censos

DICIEMBRE 2009

ENCUESTA NACIONAL SOBRE PREVALENCIAS DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 2008

PROVINCIA DE SANTA FE



Señor Gobernador de la Provincia de Santa Fe
DR. HERMES JUAN BINNER

Ministro de Gobierno y Reforma del Estado
DR. ANTONIO BONFATTI

Secretario de Tecnologías para la Gestión
ING. JAVIER ECHANIZ

Director Provincial del Instituto Provincial
de Estadística y Censos
LIC. JORGE ALEJANDRO MOORE

Directora General del Instituto Provincial
de Estadística y Censos
Lic. RAQUEL PELLATELLI

Equipo Responsable:

Lic. Leticia Araiz
Juliana Merello

Encuesta realizada por el personal de relevamientos de datos

Diseño y diagramación
Angelina Araiz

ÍNDICE

P.08	Introducción
P.09	1. ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS
P.10	Gráfico 1.1: Población de 16 a 65 años según sexo
P.10	Gráfico 1.2: Población de 16 a 65 años según edad
P.10	Gráfico 1.3: Población de 16 a 65 años según nivel de instrucción
P.10	Gráfico 1.4: Población de 16 a 65 años según condición de actividad
P.11	Gráfico 1.5: Población de 16 a 65 años según cobertura de salud
P.11	Gráfico 1.6: Población de 16 a 65 años según ingreso del hogar
P.11	Gráfico 1.7: Población de 16 a 65 años según NBI total del hogar
P.11	Gráfico 1.8: Población de 16 a 65 años según aglomerado urbano
P.12	2. AUTOPERCEPCIÓN DE SALUD Y ENTORNO
P.12	2.1 Salud general
P.13	Gráfico 2.1.1: Población de 16 a 65 años según autopercepción de la salud general
P.13	Gráfico 2.1.2: Población de 16 a 65 años según autopercepción de la salud general, por sexo
P.13	Gráfico 2.1.3: Población de 16 a 65 años según autopercepción de la salud general, por edad
P.14	Gráfico 2.1.4: Población de 16 a 65 años según autopercepción de la salud general, por nivel de instrucción
P.14	Gráfico 2.1.5: Población de 16 a 65 años según autopercepción de la salud general, por condición de actividad
P.14	Gráfico 2.1.6: Población de 16 a 65 años según autopercepción de la salud general, por cobertura de salud
P.15	Gráfico 2.1.7: Población de 16 a 65 años según autopercepción de la salud general, por ingreso del hogar
P.15	Gráfico 2.1.8: Población de 16 a 65 años según autopercepción de la salud general, por NBI total del hogar
P.16	Gráfico 2.1.9: Población de 16 a 65 años según ocurrencia de ciertos acontecimientos en los últimos 12 meses
P.16	Gráfico 2.1.10: Población de 16 a 65 años que haya vivido ciertos acontecimientos en los últimos 12 meses, según autopercepción de la salud general
P.17	2.2 Acceso y entorno
P.17	Gráfico 2.2.1: Población de 16 a 65 años según conocimiento de personas cercanas que en la actualidad consuman alguna sustancia ilegal
P.17	Gráfico 2.2.2: Población de 16 a 65 años según conocimiento de personas cercanas que en la actualidad consuman alguna sustancia ilegal, por sexo
P.18	Gráfico 2.2.3: Población de 16 a 65 años según conocimiento de personas cercanas que en la actualidad consuman alguna sustancia ilegal, por edad
P.18	Gráfico 2.2.4: Población de 16 a 65 años que conoce personas cercanas que en la actualidad consuman alguna sustancia ilegal, según cantidad de personas que conoce
P.18	Gráfico 2.2.5: Población de 16 a 65 años según curiosidad por probar alguna sustancia ilegal
P.19	Gráfico 2.2.6: Población de 16 a 65 años según curiosidad por probar alguna sustancia ilegal, por sexo
P.19	Gráfico 2.2.7: Población de 16 a 65 años según curiosidad por probar alguna sustancia ilegal, por edad
P.19	Gráfico 2.2.8: Población de 16 a 65 años según posibilidad de probar alguna sustancia ilegal
P.20	Gráfico 2.2.9: Población de 16 a 65 años según posibilidad de probar alguna sustancia ilegal, por sexo
P.20	Gráfico 2.2.10: Población de 16 a 65 años según posibilidad de probar alguna sustancia ilegal, por edad
P.20	Gráfico 2.2.11: Población de 16 a 65 años que tuvo la posibilidad de probar alguna sustancia ilegal, según cantidad de veces
P.21	Gráfico 2.2.12: Población de 16 a 65 años según probaría o no alguna sustancia ilegal si tuviera la ocasión
P.21	Gráfico 2.2.13: Población de 16 a 65 años según probaría o no alguna sustancia ilegal si tuviera la ocasión, por sexo
P.21	Gráfico 2.2.14: Población de 16 a 65 años según probaría o no alguna sustancia ilegal si tuviera la ocasión, por edad
P.22	Gráfico 2.2.15: Población de 16 a 65 años según facilidad para conseguir sustancias psicoactivas, por sustancia
P.22	Gráfico 2.2.16: Población de 16 a 65 años según facilidad para conseguir tranquilizantes, por edad

- P.23 *Gráfico 2.2.17: Población de 16 a 65 años según facilidad para conseguir estimulantes, por edad*
- P.23 *Gráfico 2.2.18: Población de 16 a 65 años según facilidad para conseguir marihuana, por edad*
- P.23 *Gráfico 2.2.19: Población de 16 a 65 años según facilidad para conseguir cocaína, por edad*
- P.23 *Gráfico 2.2.20: Población de 16 a 65 años según facilidad para conseguir pasta base, por edad*
- P.24 *Gráfico 2.2.21: Población de 16 a 65 años según facilidad para conseguir éxtasis, por edad*
- P.24 *Gráfico 2.2.22: Población de 16 a 65 años según facilidad para conseguir tranquilizantes, por aglomerado urbano*
- P.24 *Gráfico 2.2.23: Población de 16 a 65 años según facilidad para conseguir estimulantes, por aglomerado urbano*
- P.25 *Gráfico 2.2.24: Población de 16 a 65 años según facilidad para conseguir marihuana, por aglomerado urbano*
- P.25 *Gráfico 2.2.25: Población de 16 a 65 años según facilidad para conseguir cocaína, por aglomerado urbano*
- P.25 *Gráfico 2.2.26: Población de 16 a 65 años según facilidad para conseguir pasta base, por aglomerado urbano*
- P.25 *Gráfico 2.2.27: Población de 16 a 65 años según facilidad para conseguir éxtasis, por aglomerado urbano*
- P.26 **3. CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS**
- P.26 **3.1 Sustancias legales o sociales**
- P.26 **3.1.1 Prevalencia de vida**
- P.27 *Gráfico 3.1.1.1: Prevalencia de vida de consumo de sustancias psicoactivas legales o sociales, por sustancia*
- P.27 *Gráfico 3.1.1.2: Prevalencia de vida de consumo de sustancias psicoactivas legales o sociales, por sustancia, según sexo*
- P.27 *Gráfico 3.1.1.3: Prevalencia de vida de consumo de sustancias psicoactivas legales o sociales, por sustancia, según edad*
- P.28 *Gráfico 3.1.1.4: Prevalencia de vida de consumo de sustancias psicoactivas legales o sociales, por sustancia, según nivel de instrucción*
- P.28 *Gráfico 3.1.1.5: Prevalencia de vida de consumo de sustancias psicoactivas legales o sociales, por sustancia, según ingreso del hogar*
- P.28 *Gráfico 3.1.1.6: Prevalencia de vida de consumo de sustancias psicoactivas legales o sociales, por sustancia, según NBI total del hogar*
- P.29 **3.1.2 Prevalencia del último año**
- P.29 *Gráfico 3.1.2.1: Prevalencia del último año de consumo de sustancias psicoactivas legales o sociales, por sustancia*
- P.30 *Gráfico 3.1.2.2: Prevalencia del último año de consumo de sustancias psicoactivas legales o sociales, por sustancia, según sexo*
- P.30 *Gráfico 3.1.2.3: Prevalencia del último año de consumo de sustancias psicoactivas legales o sociales, por sustancia, según edad*
- P.30 *Gráfico 3.1.2.4: Prevalencia del último año de consumo de sustancias psicoactivas legales o sociales, por sustancia, según nivel de instrucción*
- P.30 *Gráfico 3.1.2.5: Prevalencia del último año de consumo de sustancias psicoactivas legales o sociales, por sustancia, según ingreso del hogar.*
- P.31 *Gráfico 3.1.2.6: Prevalencia del último año de consumo de sustancias psicoactivas legales o sociales, por sustancia, según NBI total del hogar*
- P.31 *Gráfico 3.1.2.7: Prevalencia del último año de consumo de sustancias psicoactivas legales o sociales, por sustancia, según autopercepción de la salud general*
- P.31 **3.1.3 Prevalencia del último mes**
- P.32 *Gráfico 3.1.3.1: Prevalencia del último mes de consumo de sustancias psicoactivas legales o sociales, por sustancia*
- P.32 *Gráfico 3.1.3.2: Prevalencia del último mes de consumo de sustancias psicoactivas legales o sociales, por sustancia, según sexo*
- P.32 *Gráfico 3.1.3.3: Prevalencia del último mes de consumo de sustancias psicoactivas legales o sociales, por sustancia, según edad*
- P.33 *Gráfico 3.1.3.4: Prevalencia del último mes de consumo de sustancias psicoactivas legales o sociales, por sustancia, según nivel de instrucción*
- P.33 *Gráfico 3.1.3.5: Prevalencia del último mes de consumo de sustancias psicoactivas legales o sociales, por sustancia, según ingreso del hogar*
- P.33 *Gráfico 3.1.3.6: Prevalencia del último mes de consumo de sustancias psicoactivas legales o sociales, por sustancia, por NBI total del hogar*
- P.33 *Gráfico 3.1.3.7: Prevalencia del último mes de consumo de sustancias psicoactivas legales o sociales, por sustancia, por autopercepción de la salud general*
- P.34 **3.1.4 Bebidas alcohólicas**
- P.34 *Gráfico 3.1.4.1: Población de 16 a 65 años que consumió alguna vez en su vida bebidas alcohólicas según primera vez que consumió y última vez que consumió*
- P.34 *Gráfico 3.1.4.2: Población de 16 a 65 años que consumió alguna vez en el último mes bebidas alcohólicas según emborrachamiento alguna vez en los últimos 30 días*
- P.35 *Gráfico 3.1.4.3: Cantidad de días de consumo de ciertas bebidas alcohólicas, en los últimos 30 días, por bebida*
- P.35 **3.1.4.1 Consumo episódico excesivo de bebidas alcohólicas**
- P.36 *Gráfico 3.1.4.1.1: Población de 16 a 65 años que consumió alguna vez en el último mes bebidas alcohólicas con consumo episódico excesivo, para cada situación*

- P.36 3.1.4.2 Abuso de bebidas alcohólicas
- P.36 *Gráfico 3.1.4.2.1: Población de 16 a 65 años que consumió alguna vez en el último mes bebidas alcohólicas con abuso, para cada situación*
- P.37 3.2 Sustancias ilegales
- P.37 3.2.1 Prevalencia de vida
- P.37 *Gráfico 3.1.1.1: Prevalencia de vida de consumo de sustancias psicoactivas ilegales, por tipo de sustancia*
- P.38 *Gráfico 3.1.1.2: Prevalencia de vida de consumo de sustancias psicoactivas ilegales, por sexo*
- P.38 *Gráfico 3.1.1.3: Prevalencia de vida de consumo de sustancias psicoactivas ilegales, por edad*
- P.38 *Gráfico 3.1.1.4: Prevalencia de vida de consumo de sustancias psicoactivas ilegales, por nivel de instrucción*
- P.38 *Gráfico 3.1.1.5: Prevalencia de vida de consumo de sustancias psicoactivas ilegales, por ingreso del hogar*
- P.39 *Gráfico 3.1.1.6: Prevalencia de vida de consumo de sustancias psicoactivas ilegales, por NBI total del hogar*
- P.39 3.2.2 Prevalencia del último año
- P.39 *Gráfico 3.2.2.1: Prevalencia del último año de consumo de sustancias psicoactivas ilegales, por sustancia*
- P.40 *Gráfico 3.2.2.2: Prevalencia del último año de consumo de sustancias psicoactivas ilegales, por sexo*
- P.40 *Gráfico 3.2.2.3: Prevalencia del último año de consumo de sustancias psicoactivas ilegales, por edad*
- P.40 *Gráfico 3.2.2.4: Prevalencia del último año de consumo de sustancias psicoactivas ilegales, por nivel de instrucción*
- P.40 *Gráfico 3.2.2.5: Prevalencia del último año de consumo de sustancias psicoactivas ilegales, por ingreso del hogar*
- P.41 *Gráfico 3.2.2.6: Prevalencia del último año de consumo de sustancias psicoactivas ilegales, por NBI total del hogar*
- P.41 *Gráfico 3.2.2.7: Prevalencia del último año de consumo de sustancias psicoactivas ilegales, por autopercepción de la salud general*
- P.41 3.2.3 Prevalencia del último mes
- P.41 *Gráfico 3.2.3.1: Prevalencia del último mes de consumo de sustancias psicoactivas ilegales, por sustancia*
- P.42 *Gráfico 3.2.3.2: Prevalencia del último mes de consumo de sustancias psicoactivas ilegales, por sexo*
- P.42 *Gráfico 3.2.3.3: Prevalencia del último mes de consumo de sustancias psicoactivas ilegales, por edad*
- P.42 *Gráfico 3.2.3.4: Prevalencia del último mes de consumo de sustancias psicoactivas ilegales, por nivel de instrucción*
- P.42 *Gráfico 3.2.3.5: Prevalencia del último mes de consumo de sustancias psicoactivas ilegales, por ingreso del hogar*
- P.43 *Gráfico 3.2.3.6: Prevalencia del último mes de consumo de sustancias psicoactivas ilegales, por NBI total del hogar*
- P.43 *Gráfico 3.2.3.7: Prevalencia del último mes de consumo de sustancias psicoactivas ilegales, por autopercepción de la salud general*
- P.43 3.2.4 Dependencia de ciertas sustancias ilegales
- P.43 *Gráfico 3.2.4.1: Población de 16 a 65 años que consumió marihuana durante el último año según dependencia de consumo de la misma*
- P.44 3.3 Fármacos
- P.44 3.3.1 Prevalencia de vida
- P.44 *Gráfico 3.3.1.1: Prevalencia de vida de consumo de fármacos, por sustancia*
- P.44 *Gráfico 3.3.1.2: Prevalencia de vida de consumo de fármacos, por sexo*
- P.45 *Gráfico 3.3.1.3: Prevalencia de vida de consumo de fármacos, por edad*
- P.45 *Gráfico 3.3.1.4: Prevalencia de vida de consumo de fármacos, por nivel de instrucción*
- P.45 *Gráfico 3.3.1.5: Prevalencia de vida de consumo de fármacos, por ingreso del hogar*
- P.45 *Gráfico 3.3.1.6: Prevalencia de vida de consumo de fármacos, por NBI total del hogar*
- P.46 3.3.2 Prevalencia del último año
- P.46 *Gráfico 3.3.2.1: Prevalencia del último año de consumo de fármacos, por sustancia*
- P.46 *Gráfico 3.3.2.2: Prevalencia del último año de consumo de fármacos, por sexo*
- P.46 *Gráfico 3.3.2.3: Prevalencia del último año de consumo de fármacos, por edad*
- P.47 *Gráfico 3.3.2.4: Prevalencia del último año de consumo de fármacos, por nivel de instrucción*
- P.47 *Gráfico 3.3.2.5: Prevalencia del último año de consumo de fármacos, por ingreso del hogar*
- P.47 *Gráfico 3.3.2.6: Prevalencia del último año de consumo de fármacos, por NBI total del hogar*
- P.47 *Gráfico 3.3.2.7: Prevalencia del último año de consumo de fármacos, por autopercepción de la salud general*
- P.48 3.3.3 Prevalencia del último mes
- P.48 *Gráfico 3.3.3.1: Prevalencia del último mes de consumo de fármacos, por sustancia*

- P.48 *Gráfico 3.3.3.2: Prevalencia del último mes de consumo de fármacos, por sexo*
- P.48 *Gráfico 3.3.3.3: Prevalencia del último mes de consumo de fármacos, por edad*
- P.49 *Gráfico 3.3.3.4: Prevalencia del último mes de consumo de fármacos, por nivel de instrucción*
- P.49 *Gráfico 3.3.3.5: Prevalencia del último mes de consumo de fármacos, por ingreso del hogar*
- P.49 *Gráfico 3.3.3.6: Prevalencia del último mes de consumo de fármacos, por NBI total del hogar*
- P.49 *Gráfico 3.3.3.7: Prevalencia del último mes de consumo de fármacos, por autopercepción de la salud general*
- P.50 3.4 Edad de inicio de consumo de las sustancias psicoactivas
- P.50 *Gráfico 3.4.1: Distribución de la edad de inicio de consumo de sustancias psicoactivas legales o sociales*
- P.51 *Gráfico 3.4.2: Distribución de la edad de inicio de consumo de sustancias psicoactivas ilegales*
- P.51 *Gráfico 3.4.3: Distribución de la edad de inicio de consumo de fármacos*
- P.52 4. DEMANDA DE TRATAMIENTO
- P.52 *Gráfico 4.1: Población de 16 a 65 años que consumió alguna vez en su vida alguna sustancia psicoactiva, según haya buscado ayuda profesional para tratar de disminuir el consumo de las mismas*
- P.53 *Gráfico 4.2: Población de 16 a 65 años que consumió alguna vez en su vida sustancias psicoactivas y buscó ayuda profesional para tratar de disminuir el consumo de las mismas, según asistencia a ciertos lugares, por lugar*
- P.54 *Gráfico 4.3: Población de 16 a 65 años que consumió alguna vez en su vida alguna de las sustancias psicoactivas y que buscó ayuda profesional para tratar de disminuir el consumo de las mismas, según está o estuvo en tratamiento por consumo de sustancias*
- P.55 5. OPINIÓN SOBRE EL RIESGO DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
- P.55 *Gráfico 5.1: Población de 16 a 65 años según opinión sobre el riesgo que corre una persona que toma bebidas alcohólicas, por frecuencia de consumo*
- P.55 *Gráfico 5.2: Población de 16 a 65 años según opinión sobre el riesgo que corre una persona que fuma cigarrillos, por frecuencia de consumo.*
- P.56 *Gráfico 5.3: Población de 16 a 65 años según opinión sobre el riesgo que corre una persona que consume marihuana, por frecuencia de consumo*
- P.56 *Gráfico 5.4: Población de 16 a 65 años según opinión sobre el riesgo que corre una persona que consume cocaína, por frecuencia de consumo*
- P.57 *Gráfico 5.5: Población de 16 a 65 años según opinión sobre el riesgo que corre una persona que consume pasta base, por frecuencia de consumo*
- P.57 *Gráfico 5.6: Población de 16 a 65 años según opinión sobre el riesgo que corre una persona que consume éxtasis, por frecuencia de consumo*
- P.58 *Gráfico 5.7: Población de 16 a 65 años según opinión sobre el riesgo que corre una persona que consume tranquilizantes sin indicación médica, por frecuencia de consumo*
- P.58 *Gráfico 5.8: Población de 16 a 65 años según opinión sobre el riesgo que corre una persona que consume estimulantes sin indicación médica, por frecuencia de consumo*
- P.59 *Gráfico 5.9: Población de 16 a 65 años según opinión sobre el riesgo que corre una persona que consume de vez en cuando sustancias psicoactivas, por sustancia*
- P.59 *Gráfico 5.10: Población de 16 a 65 años según opinión sobre el riesgo que corre una persona que consume frecuentemente sustancias psicoactivas, por sustancia*
- P.60 Anexo
- P.60 1. ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS
- P.61 2. AUTOPERCEPCIÓN DE SALUD Y ENTORNO
- P.69 3. CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
- P.81 4. DEMANDA DE TRATAMIENTO
- P.84 5. OPINIÓN SOBRE EL RIESGO DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

INSTITUTO PROVINCIAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS

Salta 2661 - Piso 3 - (3000) Santa Fe - C.C. N: 140

Tel.: +54 (342) 457-3753 / 457-3783 / 457-2539 | Tel.Fax: 457-4792 / 457-3747

Correo electrónico: rpell@indec.mecon.gov.ar | jmoor@indec.mecon.gov.ar

Mendoza 1085 – Piso 4 Oficina 4 – (2000) Rosario

Tel.: +54 (341) 472-1115 / 472-1156 / 472-1317

Correo electrónico: ipecrosario@indec.mecon.gov.ar



ENCUESTA NACIONAL SOBRE PREVALENCIAS
DE CONSUMO DE SUSTANCIAS
PSICOACTIVAS 2008



Resultados de la Provincia de Santa Fe

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) llevó a cabo la Encuesta Nacional sobre Prevalencias de Consumo de Sustancias Psicoactivas 2008 (ENPreCoSP-2008), mediante un convenio suscripto conjuntamente con el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, a través del Comité Científico Asesor en Materia de Represión del Narcotráfico y Criminalidad Compleja, y el Ministerio de Salud, con la participación de las Direcciones de Estadística en cada una de las 24 jurisdicciones del país.

El objetivo general de esta Encuesta fue contribuir a actualizar el sistema de información sobre el consumo de sustancias psicoactivas¹ a nivel nacional y, de esa manera, al diseño de políticas públicas más eficaces, orientadas a mejorar las condiciones de salud de la población.

Sus objetivos específicos fueron:

- estimar la cantidad de personas que declararon haber consumido sustancias psicoactivas en diferentes períodos de referencia (prevalencias) y su incidencia en relación con la población total.
- determinar las características sociodemográficas, socioeconómicas, educativas y del entorno familiar social de la población de 16 a 65 años de edad que consume sustancias psicoactivas.

El relevamiento se desarrolló entre los meses de mayo y junio de 2008.

La población objetivo para esta encuesta comprende las personas con edades entre 16 y 65 años que habitan en viviendas particulares ubicadas en localidades urbanas de 5.000 y más habitantes de la República Argentina.

La encuesta permite considerar los siguientes dominios de estimación:

- total del país;
- 6 regiones estadísticas (GBA, Pampeana, NOA, NEA, Cuyo y Patagonia);
- 4 agrupamientos de poblaciones urbanas (más de 1.500.000 habitantes, de 500.001 a 1.500.000 habitantes, de 100.001 a 500.000 habitantes, de 5.000 a 100.000 habitantes);
- División política (23 provincias, y Ciudad de Buenos Aires);
- 7 aglomerados urbanos de 500.000 y más habitantes (Gran Buenos Aires, Gran Córdoba, Gran Rosario, Gran Mendoza, Gran Tucumán-Tafí Viejo, Gran La Plata, y Mar del Plata-Batán).

En esta publicación se presentan los resultados de la encuesta de la Provincia de Santa Fe. Los datos numéricos de los gráficos se presentan mediante cuadros en el Anexo, con información correspondiente a los coeficientes de variación. En la página web del INDEC se pueden encontrar las comparaciones de algunos de los indicadores por regiones y provincias.

1 Se entiende por sustancias psicoactivas a las drogas legales o sociales (tabaco y bebidas alcohólicas), ilegales (marihuana, cocaína, pasta base, éxtasis, opiáceos y anestésicos, crack, alucinógenos, inhalables y otras drogas) y fármacos (estimulantes, tranquilizantes y anorexígenos).

1. ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS

En esta sección se presentan las características sociodemográficas de la población de 16 a 65 años de la Provincia de Santa Fe durante mayo y junio de 2008. Se considera el sexo, la edad, el nivel de instrucción, la condición de actividad y la cobertura de salud de las personas encuestadas.

Con respecto a los hogares donde habitan las personas encuestadas se analiza el ingreso mensual total del mismo y el número de necesidades básicas insatisfechas².

Se presentan las características urbanas donde habitan las personas encuestadas como el tipo de aglomerado urbano.

El 52,9% de la población de 16 a 65 años de edad de la provincia de Santa Fe es mujer, con respecto a la edad, el 26,8% tiene entre 16 y 24 años, el 22,6% tiene entre 25 y 34 años, el 25,7% tiene entre 35 y 49 años y el 24,9% entre 50 y 65 años.

En relación al nivel de instrucción, el 4,7% tiene primario incompleto, el 21,8% tiene primario completo, el 22,3% tiene secundario incompleto, el 21,3% tiene secundario completo, el 14,3% tiene terciario o universitario incompleto y el 14,1% tiene terciario o universitario completo o más.

Con respecto a la condición de actividad, el 67,3% de la población provincial de 16 a 65 años está ocupada, el 29,0% está inactiva y el 3,7% está desocupada.

En relación a la cobertura de salud, el 44,3% de la población mencionada tiene obra social, el 28,1% no está asociado a nada, el 23,4% tiene plan privado y el 2,2% tiene plan o servicio público o servicio de emergencia.

Con respecto al ingreso mensual total del hogar de las personas consideradas, el 29,3% de ellas vive en hogares con un ingreso total de a lo sumo \$1.250, el 43,4% tiene un ingreso de entre \$1.250 y \$3.000, y el 16,2% tiene un ingreso de más de \$3.000.

En relación al número de necesidades básicas insatisfechas, el 86,8% de las personas habita en hogares que no tienen ningún indicador de necesidades básicas insatisfechas, el 11,1% habita en hogares que presentan un indicador, y el 2,1% habita en hogares que presentan más de un indicador. Analizando cada indicador individualmente, se observa que el 1,5% de los hogares tiene vivienda inadecuada, el 3,3% tiene problemas de hacinamiento, el 9,1% no tiene baño, y el 1,4% tiene inasistencia escolar.

Con respecto a características urbanas, el 48,1% se encuentra en el aglomerado Gran Rosario mientras que el resto habita en otros aglomerados de la provincia de Santa Fe.

2 El NBI total del hogar está compuesto por los siguientes indicadores: vivienda inadecuada, hacinamiento, hogares sin baño, e inasistencia escolar.

Gráfico 1.1: Población de 16 a 65 años según sexo




Gráfico 1.2: Población de 16 a 65 años según edad




Gráfico 1.3: Población de 16 a 65 años según nivel de instrucción




Gráfico 1.4: Población de 16 a 65 años según condición de actividad




Gráfico 1.5: Población de 16 a 65 años según cobertura de salud




Gráfico 1.6: Población de 16 a 65 años según ingreso del hogar



Gráfico 1.7: Población de 16 a 65 años según NBI total del hogar





Gráfico 1.8: Población de 16 a 65 años según aglomerado urbano



2. AUTOPERCEPCIÓN DE SALUD Y ENTORNO

En esta sección se indagó sobre la autopercepción de la salud general de las personas encuestadas, y sobre aspectos relacionados al acceso de sustancias psicoactivas y la situación con el entorno.

2.1 Salud General

En primer lugar se indagó sobre la autopercepción de la salud general de las personas encuestadas. Además se preguntó sobre el acontecimiento de algún accidente que haya impedido realizar las actividades habituales por uno o más días, sobre el sufrimiento de alguna enfermedad por la que haya debido guardar cama o reposo bajo consejo médico, y sobre la visita a algún profesional de la salud por problemas de angustia, relaciones personales, depresión u otros; considerando estos hechos en los últimos 12 meses.

El 86,6% de la población de 16 a 65 años de la Provincia, manifestó que su salud general es excelente, muy buena o buena, mientras que el 13,4% restante cree que su salud es regular o mala.

Con respecto al sexo, la proporción de hombres y de mujeres que manifestó tener salud general excelente, muy buena o buena es similar (88,0% y 85,4% respectivamente). En relación a la edad, a medida que ésta aumenta, disminuye el porcentaje de personas con autopercepción de salud general excelente, muy buena o buena (de 93,7% para las personas de 16 a 24 años hasta 74,3% para las personas de 50 a 65 años).

En relación al nivel de instrucción, se observa a mayor nivel de instrucción mayor autopercepción de la salud general excelente, muy buena o buena (crece de 71,0% para las personas con hasta primario incompleto hasta 92,8% para las personas con secundario completo y más).

Considerando la condición de actividad, el porcentaje de personas con autopercepción de la salud general excelente, muy buena o buena es inferior para las personas desocupadas (74,3%) que para las personas inactivas y ocupadas (82,3% y 89,1% respectivamente).

Con respecto a la cobertura de salud, se observa que el porcentaje de personas con autopercepción de la salud general excelente, muy buena o buena es levemente inferior para las personas sin cobertura (81,6%) que para las personas que tienen plan privado u obra social (89,4% y 88,4% respectivamente).

A mayor ingreso mensual del hogar aumenta el porcentaje de personas con autopercepción de la salud general excelente, muy buena o buena (crece de 79,4% para las personas con ingreso del hogar con hasta \$1.250 a 95,3% para las personas con ingreso del hogar de \$3.000 y más).

Con respecto al número de necesidades básicas insatisfechas del hogar, el porcentaje de personas con autopercepción de la salud general excelente, muy buena o buena es superior cuando habitan en hogares sin necesidades básicas insatisfechas (88,4% vs. 74,1% para las personas que habitan en hogares con una necesidad básica insatisfecha).

Gráfico 2.1.1: Población de 16 a 65 años según autopercepción de la salud general




Gráfico 2.1.2: Población de 16 a 65 años según autopercepción de la salud general, por sexo




Gráfico 2.1.3: Población de 16 a 65 años según autopercepción de la salud general, por edad






Gráfico 2.1.4: Población de 16 a 65 años según auto percepción de la salud general, por nivel de instrucción




Nota: se excluye la categoría "Educación especial" debido a la baja participación en la población total (0,1%)

Gráfico 2.1.5: Población de 16 a 65 años según auto percepción de la salud general, por condición de actividad



Nota: la categoría "Desocupado" presenta baja participación en la población total (3,7%)

Gráfico 2.1.6: Población de 16 a 65 años según auto percepción de la salud general, por cobertura de salud



Nota: se excluyen las categorías "Plan o servicio público o servicio de emergencia" y "Ns/Nc" debido a la baja participación en la población total (2,2% y 2,1% respectivamente)

Gráfico 2.1.7: Población de 16 a 65 años según autopercepción de la salud general, por ingreso del hogar





Gráfico 2.1.8: Población de 16 a 65 años según autopercepción de la salud general, por NBI total del hogar




Nota: la categoría "Más de un indicador" presenta baja participación en la población total (2,1%)

A continuación se presenta información respecto a ciertos acontecimientos vinculados con accidentes, enfermedades y visitas a profesionales de la salud. Con respecto al acontecimiento de algún accidente durante los últimos 12 meses que haya impedido realizar las actividades habituales por uno o más días, el 92,7% de la población de 16 a 65 años de la Provincia manifestó no haber sufrido algún accidente. En relación al sexo, el acontecimiento de algún accidente fue levemente mayor en varones que en mujeres (8,4% vs. 6,1%).

Por otra parte, con respecto al acontecimiento de alguna enfermedad durante los últimos 12 meses por la que haya debido guardar cama o reposo bajo consejo médico, el 81,0% de dicha población manifestó no haber sufrido alguna enfermedad. En relación al sexo, el sufrimiento de alguna enfermedad fue levemente mayor en varones que en mujeres (20,4% vs. 17,5%).

En relación a la visita a algún profesional de la salud por problemas de angustia, relaciones personales, depresión u otros temas durante los últimos 12 meses, el 83,6% de la población en estudio manifestó no haber tenido que realizar visitas. Con respecto al sexo, aproximadamente el doble de mujeres que de varones hizo alguna visita (21,1% vs. 11,1%).

Gráfico 2.1.9: Población de 16 a 65 años según ocurrencia de ciertos acontecimientos en los últimos 12 meses




Acontecimientos: * Sufrimiento de algún accidente que le haya impedido realizar las actividades habituales por uno o más días;
 * Sufrimiento de una enfermedad por la que debió guardar cama o reposo bajo consejo médico;
 * Visita a algún profesional de la salud por problemas de angustia, relaciones personales, depresión u otros.

Se observa que existe relación entre la autopercepción de la salud general y el acontecimiento de un accidente en los últimos 12 meses. Para las personas con estado de salud de excelente a buena, el porcentaje que sufrió un accidente es inferior (5,4%) a las personas con estado de salud regular o mala (18,5%).

Ocurre lo mismo con el acontecimiento de una enfermedad por la que haya tenido que guardar cama o reposo bajo consejo médico. Para las personas con estado de salud de excelente a buena, el porcentaje que sufrió una enfermedad es inferior (16,2%) a las personas con estado de salud regular o mala (36,3%).

Se observa una relación similar entre la salud general y la visita a algún profesional de la salud por problemas de angustia, relaciones personales, depresión u otros temas; a mejor estado de salud menor visita a profesionales. Para las personas con estado de salud de excelente a buena, el porcentaje que visitó a algún profesional es inferior (13,3%) a las personas con estado de salud regular o mala (36,7%).

Gráfico 2.1.10: Población de 16 a 65 años que haya vivido ciertos acontecimientos en los últimos 12 meses, según autopercepción de la salud general



Acontecimientos: * Sufrimiento de algún accidente que le haya impedido realizar las actividades habituales por uno o más días;
 * Sufrimiento de una enfermedad por la que debió guardar cama o reposo bajo consejo médico;
 * Visita a algún profesional de la salud por problemas de angustia, relaciones personales, depresión u otros.

2.2 Acceso y entorno

En esta sección se indagó a las personas encuestadas si conocen personas cercanas que en la actualidad consuman sustancias como marihuana, cocaína, éxtasis, u otras drogas; y cuántas personas conocen aproximadamente. Además se preguntó si tuvieron curiosidad y posibilidad de probar alguna de estas drogas, si tuvieran la ocasión de probar lo harían, y también sobre el grado de dificultad para conseguir marihuana, cocaína, pasta base, éxtasis, y en el caso de tranquilizantes y estimulantes, conseguirlos sin indicación médica. En este análisis se considera el sexo, la edad, y el aglomerado urbano correspondiente de las personas encuestadas.

El 30,1% de la población de 16 a 65 años de la Provincia manifestó conocer personas cercanas que actualmente consuman alguna sustancia como marihuana, cocaína, éxtasis, u otras drogas ilegales. En los hombres es más frecuente que en las mujeres (33,6% vs. 27,0%). En relación a la edad, se observa que a medida que esta aumenta, son menos los individuos que conocen personas cercanas que consuman estas sustancias (disminuye de 45,5% para el grupo de 16 a 24 años hasta 13,5% para el grupo de 50 a 65 años).

Gráfico 2.2.1: Población de 16 a 65 años según conocimiento de personas cercanas que en la actualidad consuman alguna sustancia ilegal




Gráfico 2.2.2: Población de 16 a 65 años según conocimiento de personas cercanas que en la actualidad consuman alguna sustancia ilegal, por sexo






Gráfico 2.2.3: Población de 16 a 65 años según conocimiento de personas cercanas que en la actualidad consuman alguna sustancia ilegal, por edad



De la población de 16 a 65 años de edad que afirmó conocer personas cercanas que en la actualidad consuman alguna sustancia ilegal (marihuana, cocaína, éxtasis, etc.) el 87,5% manifestó conocer dos o más personas, y el 11,1% manifestó conocer una sola persona.

Gráfico 2.2.4: Población de 16 a 65 años que conoce personas cercanas que en la actualidad consuman alguna sustancia ilegal, según cantidad de personas que conoce



El 84,4% de la población de 16 a 65 años de edad manifestó no haber sentido curiosidad por probar alguna de estas drogas ilegales y el 12,4% si sintió curiosidad. Con respecto al sexo, la curiosidad se manifestó mayormente en varones que en mujeres (14,6% vs. 10,1%).

En relación a la edad se observa que a menor edad más frecuente es la curiosidad, 20,0% para las personas de 16 a 24 años y 17,2% para las personas de 25 a 34 años (vs. 9,3% y 2,5%, para las personas de 35 a 49 años y para las personas de 50 a 65 años respectivamente).

Gráfico 2.2.5: Población de 16 a 65 años según curiosidad por probar alguna sustancia ilegal




Gráfico 2.2.6: Población de 16 a 65 años según curiosidad por probar alguna sustancia ilegal, por sexo





Gráfico 2.2.7: Población de 16 a 65 años según curiosidad por probar alguna sustancia ilegal, por edad



El 68,3% de la población de 16 a 65 años no tuvo la posibilidad de probar alguna de estas sustancias ilegales, mientras que el 29,2% sí la tuvo. Con respecto al sexo, los varones manifiestan más tener posibilidad de probar alguna de estas sustancias que las mujeres (37,2% vs. 22,1%).

En relación a la edad se observa que a menor edad más frecuente es la posibilidad de probar estas sustancias, 38,6% para las personas de 16 a 24 años y 40,9% para las personas de 25 a 34 años (vs. 25,7% y 12,1%, para las personas de 35 a 49 años y para las personas de 50 a 65 años respectivamente).

Gráfico 2.2.8: Población de 16 a 65 años según posibilidad de probar alguna sustancia ilegal




Gráfico 2.2.9: Población de 16 a 65 años según posibilidad de probar alguna sustancia ilegal, por sexo






Gráfico 2.2.10: Población de 16 a 65 años según posibilidad de probar alguna sustancia ilegal, por edad



De la población de 16 a 65 años que tuvo la posibilidad de probar alguna sustancia ilegal, el 77,5% manifestó haber tenido dos o más posibilidades de probar, y el 20,2% una sola posibilidad.

Gráfico 2.2.11: Población de 16 a 65 años que tuvo la posibilidad de probar alguna sustancia ilegal según cantidad de veces



El 91,1% de la población de 16 a 65 años de edad manifestó que no probaría alguna sustancia ilegal si tuviera la ocasión, mientras que el 2,2% puede ser que probaría, y el 3,7% admitió que si probaría.

En relación al sexo, el porcentaje de hombres y de mujeres que declaró que no probaría alguna sustancia ilegal es similar (91,2% y 90,9% respectivamente).

En relación a la edad se observa que a mayor edad más frecuente es la afirmación de que no probaría alguna sustancia ilegal si se presentara la ocasión, 94,6% para las personas de 35 a 49 años y 94,4% para las personas de 50 a 65 años (vs. 85,0% y 90,7%, para las personas de 16 a 24 años y para las personas de 25 a 34 años respectivamente).

Gráfico 2.2.12: Población de 16 a 65 años según probaría o no alguna sustancia ilegal si tuviera la ocasión




Gráfico 2.2.13: Población de 16 a 65 años según probaría o no alguna sustancia ilegal si tuviera la ocasión, por sexo






Gráfico 2.2.14: Población de 16 a 65 años según probaría o no alguna sustancia ilegal si tuviera la ocasión, por edad



Con respecto al grado de facilidad para conseguir ciertas sustancias, una mayor cantidad de personas de 16 a 65 años creen que sería fácil conseguir marihuana, tranquilizantes, cocaína, y estimulantes (48,6%; 45,1%; 40,6% y 35,8% respectivamente). Mientras que la pasta base y el éxtasis resulta fácil de conseguir para menos cantidad de personas (26,2% y 25,4% respectivamente).

Gráfico 2.2.15: Población de 16 a 65 años según facilidad para conseguir ciertas sustancias psicoactivas, por sustancia



Si se analiza cada sustancia individualmente en relación a la edad, se observa que siempre es menor la cantidad de personas que manifiesta que sería fácil conseguir una determinada sustancia en el grupo de personas de 50 a 65 años.

En cuanto al resto de los grupos no se observan diferencias evidentes con respecto a la facilidad para conseguir tanto estimulantes, pasta base como éxtasis. En el caso de la marihuana es más accesible en los grupos más jóvenes, de 16 a 24 años y de 25 a 34 años. Con respecto a los tranquilizantes es más frecuente para los grupos intermedios, de 25 a 34 años y de 35 a 49 años, y en relación a la cocaína es más frecuente en los más jóvenes, de 16 a 24 años.

Gráfico 2.2.16: Población de 16 a 65 años según facilidad para conseguir tranquilizantes, por edad




Gráfico 2.2.17: Población de 16 a 65 años según facilidad para conseguir estimulantes, por edad




Gráfico 2.2.18: Población de 16 a 65 años según facilidad para conseguir marihuana, por edad




Gráfico 2.2.19: Población de 16 a 65 años según facilidad para conseguir cocaína, por edad




Gráfico 2.2.20: Población de 16 a 65 años según facilidad para conseguir pasta base, por edad





Gráfico 2.2.21: Población de 16 a 65 años según facilidad para conseguir éxtasis, por edad



Si se compara este aspecto entre lo que ocurre en el aglomerado Rosario y el resto de las localidades de la provincia de Santa Fe, se observa que siempre es mayor la cantidad de personas que manifiesta que sería fácil conseguir una determinada sustancia en el grupo de personas que pertenecen al aglomerado Gran Rosario, excepto para los tranquilizantes y estimulantes, que resulta similar.

Más de la mitad de las personas de Gran Rosario manifestó que sería fácil conseguir marihuana (59,3%), y cocaína (51,8%), mientras que en el resto de las localidades cerca de un tercio de las personas (38,7% y 30,2% respectivamente). En el caso de la pasta base y del éxtasis, más de un tercio de las personas de Gran Rosario tienen esta opinión (33,8% y 36,7% respectivamente), mientras que en las otras localidades menos de un quinto de las personas (19,1% y 15,0% respectivamente).

Gráfico 2.2.22: Población de 16 a 65 años según facilidad para conseguir tranquilizantes, por aglomerado urbano




Gráfico 2.2.23: Población de 16 a 65 años según facilidad para conseguir estimulantes, por aglomerado urbano




Gráfico 2.2.24: Población de 16 a 65 años según facilidad para conseguir marihuana, por aglomerado urbano




Gráfico 2.2.25: Población de 16 a 65 años según facilidad para conseguir cocaína, por aglomerado urbano




Gráfico 2.2.26: Población de 16 a 65 años según facilidad para conseguir pasta base, por aglomerado urbano





Gráfico 2.2.27: Población de 16 a 65 años según facilidad para conseguir éxtasis, por aglomerado urbano



3. CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

En esta sección, se analizan para las sustancias legales o sociales, las sustancias ilegales y los fármacos, la prevalencia de vida de consumo³, la prevalencia del último año de consumo⁴, y la prevalencia del último mes de consumo⁵, según ciertas características sociodemográficas y socioeconómicas de las personas de 16 a 65 años de la Provincia. Además se analiza el consumo episódico excesivo y el abuso de diferentes bebidas alcohólicas y la dependencia de consumo de ciertas sustancias ilegales. Por último se presentan las edades de inicio de consumo de cada sustancia psicoactiva, considerando la edad de inicio mínima, promedio, y máxima.

3.1 Sustancias legales o sociales

Dentro de las sustancias psicoactivas se encuentran las *legales o sociales*, compuestas por tabaco y bebidas alcohólicas. Se presenta la prevalencia de consumo de vida, del último año, y del último mes, en cada caso, teniendo en cuenta el sexo, la edad, el nivel de instrucción, el ingreso del hogar, el NBI total del hogar, y la autopercepción de la salud general de las personas de 16 a 65 años de la Provincia. También se analiza el consumo episódico excesivo y el abuso de diferentes bebidas alcohólicas y períodos de la semana.

3.1.1 Prevalencia de vida

El 77,2% de la población de 16 a 65 años de la Provincia consumió alguna vez en su vida bebidas alcohólicas, la prevalencia de vida de consumo de bebidas alcohólicas es mayor para los varones que para las mujeres (86,7% vs. 68,7%). Con respecto a la edad, en el grupo de personas de 50 a 64 años dicha prevalencia es levemente inferior al resto de los grupos (74,9%). A mayor nivel de instrucción mayor prevalencia de vida (aumenta de 62,4% para las personas con hasta primario incompleto hasta 80,8% para las personas con secundario completo y más). Con respecto al ingreso del hogar, cuando éste aumenta, aumenta la prevalencia de vida (crece de 69,1% para las personas con ingreso del hogar inferior a \$1.250 hasta 89,5% para las personas con ingreso del hogar superior a \$3.000). Por otra parte no hay diferencias evidentes entre las personas que residen en hogares sin ninguna necesidad básica insatisfecha y las personas que residen hogares con una necesidad básica insatisfecha (77,2% y 77,8% respectivamente).

Con respecto al tabaco, la prevalencia de vida es inferior a la de las bebidas alcohólicas, con 48,9%; y también resulta mayor en los varones que en las mujeres, más de la mitad de los varones consumió tabaco alguna vez en su vida y en el caso de las mujeres menos de la mitad (53,2% vs. 45,0%). Con respecto a la edad, en el grupo de personas de 25 a 34 años dicha prevalencia es levemente superior al resto de los grupos (55,9%). A mayor nivel de

3 Se define prevalencia de vida a la proporción de personas que consumieron cierta sustancia alguna vez en la vida sobre el total de las personas estudiadas, es decir, las personas de 16 a 65 años.

4 Se define prevalencia del último año a la proporción de personas que consumieron cierta sustancia alguna vez en los últimos 12 meses sobre el total de las personas estudiadas, es decir, las personas de 16 a 65 años.

5 Se define prevalencia del último mes a la proporción de personas que consumieron cierta sustancia alguna vez en los últimos 30 días sobre el total de las personas estudiadas, es decir, las personas de 16 a 65 años.

instrucción menor prevalencia de vida (disminuye de 56,6% para las personas con hasta primario incompleto hasta 45,8% para las personas con secundario completo y más). Con respecto al ingreso del hogar no se observan diferencias evidentes en la prevalencia de vida de consumo de tabaco (varía entre 46,2% y 51,1%). Dicha prevalencia es levemente superior para las personas con hogares con una necesidad básica insatisfecha que para las personas con hogares sin necesidades básicas insatisfechas (51,9% y 48,1% respectivamente).

Gráfico 3.1.1.1: Prevalencia de vida de consumo de sustancias psicoactivas legales o sociales, por sustancia




Gráfico 3.1.1.2: Prevalencia de vida de consumo de sustancias psicoactivas legales o sociales, por sustancia, según sexo




Gráfico 3.1.1.3: Prevalencia de vida de consumo de sustancias psicoactivas legales o sociales, por sustancia, según edad




Gráfico 3.1.1.4: Prevalencia de vida de consumo de sustancias psicoactivas legales o sociales, por sustancia, según nivel de instrucción




Gráfico 3.1.1.5: Prevalencia de vida de consumo de sustancias psicoactivas legales o sociales, por sustancia, según ingreso del hogar





Gráfico 3.1.1.6: Prevalencia de vida de consumo de sustancias psicoactivas legales o sociales, por sustancia, según NBI total del hogar



Nota: la categoría "Más de un indicador" presenta baja participación en la población total (2,1%)

3.1.2 Prevalencia del último año

El 72,5% de la población de 16 a 65 años de la Provincia consumió bebidas alcohólicas alguna vez en el último año, con respecto al sexo, la prevalencia del último año es mayor para los varones que para las mujeres (83,5% vs. 62,8%). En relación a la edad, no se observan diferencias evidentes entre los grupos con respecto a dicha prevalencia (varía entre 71,0% y 74,4%). A mayor nivel de instrucción mayor prevalencia (aumenta de 58,8% para las personas con hasta primario incompleto hasta 76,3% para las personas con secundario completo y más). Con respecto al ingreso del hogar, cuando éste aumenta, aumenta la prevalencia del último año (crece de 61,5% para las personas con ingreso del hogar inferior a \$1.250 hasta 86,5% para las personas con ingreso del hogar superior a \$3.000). Por otra parte, dicha prevalencia es similar entre las personas con hogares sin necesidades básicas insatisfechas y las personas con hogares con una necesidad básica insatisfecha (73,2% y 70,4% respectivamente). Con respecto a la autopercepción de la salud general, la prevalencia del último año es mayor para las personas con autopercepción excelente, muy buena o buena (73,5% vs. 66,4% para las personas con autopercepción regular o mala).

Con respecto al tabaco, la prevalencia del último año es inferior a la de las bebidas alcohólicas, con 35,6%; y resulta levemente mayor en los varones que en las mujeres, aproximadamente dos quintos de los varones consumió tabaco alguna vez en el último año y en el caso de las mujeres un tercio (38,3% vs. 33,2%). Con respecto a la edad, dicha prevalencia es mayor para los grupos más jóvenes (40,3% y 43,2% para las personas de 16 a 24 años y de 26 a 34 años vs. 30,9% y 28,4% para las personas de 35 a 49 años y de 50 a 65 años respectivamente). La menor prevalencia se observa en el grupo de personas con secundario completo y más (31,2% vs. 38,3% para las personas con hasta primario incompleto y 40,3% para las personas con hasta secundario incompleto). Con respecto al ingreso del hogar, a mayor ingreso menor prevalencia (disminuye levemente de 37,9% hasta 33,8%). Por otra parte, dicha prevalencia es superior para las personas con hogares con una necesidad básica insatisfecha que para las personas con hogares sin necesidades básicas insatisfechas (41,8% y 34,5% respectivamente). Con respecto a la salud general, la prevalencia del último año es mayor para las personas con autopercepción de la salud general regular o mala (44,3% vs. 34,2% para las personas con autopercepción excelente, muy buena o buena).

Gráfico 3.1.2.1: Prevalencia del último año de consumo de sustancias psicoactivas legales o sociales, por sustancia




Gráfico 3.1.2.2: Prevalencia del último año de consumo de sustancias psicoactivas legales o sociales, por sustancia, según sexo




Gráfico 3.1.2.3: Prevalencia del último año de consumo de sustancias psicoactivas legales o sociales, por sustancia, según edad




Gráfico 3.1.2.4: Prevalencia del último año de consumo de sustancias psicoactivas legales o sociales, por sustancia, según nivel de instrucción




Gráfico 3.1.2.5: Prevalencia del último año de consumo de sustancias psicoactivas legales o sociales, por sustancia, según ingreso del hogar





Gráfico 3.1.2.6: Prevalencia del último año de consumo de sustancias psicoactivas legales o sociales, por sustancia, según NBI total del hogar



Nota: la categoría "Más de un indicador" presenta baja participación en la población total (2,1%)

Gráfico 3.1.2.7: Prevalencia del último año de consumo de sustancias psicoactivas legales o sociales, por sustancia, según autopercepción de la salud general



3.1.3 Prevalencia del último mes

El 58,2% de la población de 16 a 65 años de la Provincia consumió alguna vez en el último mes bebidas alcohólicas, la prevalencia del último mes de consumo de bebidas alcohólicas es fuertemente mayor para los varones que para las mujeres (72,8% vs. 45,2%). En relación a la edad, la prevalencia es levemente mayor para el grupo de personas con edades entre 16 y 24 años (61,2% vs. valores entre 55,9% y 58,1% para los tres grupos con mayores edades). A mayor nivel de instrucción mayor prevalencia (aumenta de 47,4% para las personas con hasta primario incompleto hasta 61,6% para las personas con secundario completo y más). Con respecto al ingreso del hogar, cuando éste aumenta, aumenta la prevalencia del último mes (crece de 45,0% para las personas con ingreso del hogar inferior a \$1.250 hasta 74,1% para las personas con ingreso del hogar superior a \$3.000). Por otra parte, no hay diferencias de dicha prevalencia entre las personas con hogares sin ninguna necesidad básica insatisfecha y las personas con hogares con una necesidad básica insatisfecha (58,7% y 58,4% respectivamente). Con respecto a la salud general, la prevalencia del último mes es levemente mayor para las personas con autopercepción de la salud general excelente, muy buena o buena (59,2% vs. 52,0% para las personas con autopercepción regular o mala).

Con respecto al tabaco, la prevalencia del último mes es inferior a la de las bebidas alcohólicas, con 32,6%; y resulta mayor en los varones que en las mujeres, más de un tercio de los varones consumió tabaco alguna vez en el último mes y en el caso de las mujeres menos de un tercio (35,9% vs. 29,7%). Con respecto a la edad, la prevalencia

es levemente mayor para los grupos más jóvenes (36,5% y 38,1% para las personas de 16 a 24 años y de 26 a 34 años vs. 28,9% y 27,3% para las personas de 35 a 49 años y de 50 a 65 años respectivamente). La menor prevalencia se observa en el grupo de personas con secundario completo y más (28,1% vs. 38,2% para las personas con hasta primario incompleto y 37,1% para las personas con hasta secundario incompleto). Con respecto al ingreso del hogar, disminuye muy suavemente a mayor ingreso (35,3% hasta 30,2% respectivamente). Por otra parte, dicha prevalencia es superior para las personas con hogares con una necesidad básica insatisfecha que para las personas con hogares sin necesidades básicas insatisfechas (39,4% y 31,4% respectivamente). Con respecto a la salud general, la prevalencia del último mes es mayor para las personas con autopercepción de la salud general regular o mala (41,5% vs. 31,3% para las personas con autopercepción excelente, muy buena o buena).

Gráfico 3.1.3.1: Prevalencia del último mes de consumo de sustancias psicoactivas legales o sociales, por sustancia




Gráfico 3.1.3.2: Prevalencia del último mes de consumo de sustancias psicoactivas legales o sociales, por sustancia, según sexo




Gráfico 3.1.3.3: Prevalencia del último mes de consumo de sustancias psicoactivas legales o sociales, por sustancia, según edad




Gráfico 3.1.3.4: Prevalencia del último mes de consumo de sustancias psicoactivas legales o sociales, por sustancia, según nivel de instrucción




Gráfico 3.1.3.5: Prevalencia del último mes de consumo de sustancias psicoactivas legales o sociales, por sustancia, según ingreso del hogar






Gráfico 3.1.3.6: Prevalencia del último mes de consumo de sustancias psicoactivas legales o sociales, por sustancia, según NBI total del hogar



Nota: la categoría "Más de un indicador" presenta baja participación en la población total (2,1%)

Gráfico 3.1.3.7: Prevalencia del último mes de consumo de sustancias psicoactivas legales o sociales, por sustancia, según autopercepción de la salud general



3.1.4 Bebidas alcohólicas


En esta sección se indagó sobre si alguna vez las personas han consumido bebidas alcohólicas como vino, cerveza, whisky o similares. En el caso de que hayan consumido se indagó acerca de cuando fue la primera y última vez que lo hicieron, si se han emborrachado alguna vez en los últimos 30 días, entre otras cosas.

Por otra parte, se analizan tanto el consumo episódico excesivo de bebidas alcohólicas como el abuso, en la población de 16 a 65 años que hayan consumido bebidas alcohólicas durante el último mes, para diferentes bebidas alcohólicas y diferentes períodos de la semana.

Con respecto a la población de 16 a 65 años que consumió alguna vez en su vida bebidas alcohólicas (77,2% de la población total estudiada), el 90,1% consumió por primera vez hace más de un año y el 6,0% durante los últimos 30 días.


Por otra parte, el 75,4% consumió por última vez hace menos de un mes, el 18,6% hace menos de un año pero más de un mes y el 5,9% hace más de un año.

Gráfico 3.1.4.1: Población de 16 a 65 años que consumió alguna vez en su vida bebidas alcohólicas según primera vez y última vez que consumió




Con respecto a la población de 16 a 65 años que consumió durante el último mes bebidas alcohólicas, el 85,9% manifestó no haberse emborrachado en los últimos 30 días.

Gráfico 3.1.4.2: Población de 16 a 65 años que consumió alguna vez en el último mes bebidas alcohólicas según emborrachamiento alguna vez en los últimos 30 días



En aquellas personas de 16 a 65 años que tomaron cerveza, vino o bebidas fuertes durante el último mes, se considera la cantidad de días que lo hicieron. El 62,6% de estas personas consumió durante el último mes cerveza, el 62,2% consumió vino y el 15,6% consumió bebidas fuertes. Con respecto a la cerveza, el 75% de las personas la consumió a lo sumo siete días en el último mes, con respecto al vino, el 50% de las personas lo consumió a lo sumo hasta 4 días, por otra parte el 25% lo consumió 25 días o más, y con respecto a las bebidas fuertes el 75% de las personas las consumió a lo sumo 4 días.

Gráfico 3.1.4.3: Cantidad de días de consumo de ciertas bebidas alcohólicas, en los últimos 30 días, por bebida



3.1.4.1 Consumo episódico excesivo de bebidas alcohólicas


Se estudia el consumo episódico excesivo⁶ de bebidas alcohólicas, en la población de 16 a 65 años que consumió alguna vez en el último mes bebidas alcohólicas (58,2% de la población total), para diferentes bebidas y períodos de la semana, mediante seis indicadores⁶: consumo episódico excesivo de cerveza, de vino, de bebidas fuertes, entre semana, en fin de semana y total combinado.

Se enumeran los tipos de bebidas de mayor a menor porcentaje de población con consumo episódico excesivo, los más frecuentes son *total combinado de bebidas alcohólicas* y *bebidas alcohólicas en fin de semana*, con 30,9% y 30,6% respectivamente. En menor medida continúan la *cerveza* y el *vino* con 11,2% y 13,6% respectivamente. Por último se encuentran *bebidas alcohólicas entre semana* y *bebidas fuertes* (4,5% y 0,8% respectivamente).

6 El consumo episódico excesivo se define como el consumo de cinco o más tragos al menos una vez en los últimos 30 días de los respectivos tipos de bebidas entre semana o en el fin de semana.

7 Indicadores construidos por el CDC (Centers for Disease Control and Prevention), la OPS (Organización Panamericana de la Salud) y otros organismos.

Gráfico 3.1.4.1.1: Población de 16 a 65 años que consumió alguna vez en el último mes bebidas alcohólicas con consumo episódico excesivo, para cada situación




3.1.4.2 Abuso de bebidas alcohólicas

Se estudia el abuso de bebidas alcohólicas⁸, en la población de 16 a 65 años que consumió alguna vez en el último mes bebidas alcohólicas (58,2% de la población total), para diferentes bebidas y períodos de la semana, mediante seis indicadores: abuso de cerveza, de vino, de bebidas fuertes, entre semana, en fin de semana y total combinado.

Se enumeran los tipos de bebidas de mayor a menor porcentaje de población con abuso, los más frecuentes son *total combinado de bebidas alcohólicas* y *bebidas alcohólicas en fin de semana*, con 22,1% y 21,6% respectivamente. En menor medida continúan el *vino* y la *cerveza* con 11,2% y 5,1% respectivamente. Por último se encuentran *bebidas alcohólicas entre semana* y *bebidas fuertes*.

Gráfico 3.1.4.2.1: Población de 16 a 65 años que consumió alguna vez en el último mes bebidas alcohólicas con abuso, para cada situación



8 El abuso de bebidas alcohólicas considera pesos diferenciales según el tipo de bebida: ocho tragos para cerveza, cinco tragos para vino y tres tragos para bebida fuerte.


3.2 Sustancias ilegales

Dentro de las sustancias psicoactivas se encuentran las ilegales, compuestas por alucinógenos, cocaína, crack, éxtasis, inhalables, marihuana, opiáceos y anestésicos, y pasta base. Se presenta la prevalencia de consumo de vida, del último año, y del último mes, teniendo en cuenta el sexo, la edad, el nivel de instrucción, el ingreso del hogar, el NBI total del hogar, y la autopercepción de la salud general de las personas de 16 a 65 años de la Provincia. Además se analiza la dependencia de ciertas sustancias ilegales.

3.2.1 Prevalencia de vida

De las sustancias psicoactivas ilegales, la que tiene mayor prevalencia de vida es la marihuana, el 7,9% de las personas de 16 a 65 años de la Provincia la consumió alguna vez en su vida, y luego continúa la cocaína con 2,7%. El resto de las sustancias no supera el 1,1%, de mayor a menor prevalencia de vida se presentan, los inhalables, el éxtasis, los alucinógenos, los opiáceos y anestésicos, la pasta base y el crack. Para todas estas sustancias ilegales, excepto opiáceos y anestésicos, dicha prevalencia es mayor en varones que en mujeres.

Gráfico 3.2.1.1: Prevalencia de vida de consumo de sustancias psicoactivas ilegales, por sustancia



Se analiza la prevalencia de vida de consumo de por lo menos una sustancia ilegal, es decir el porcentaje de personas que consumió al menos una sustancia ilegal alguna vez en su vida considerando, sexo, edad, nivel de instrucción, ingreso del hogar y NBI total del hogar.

La prevalencia de vida de consumo de por lo menos una sustancia ilegal es de 9,0%, en los varones es mayor que en las mujeres (11,0% vs. 7,3%). Con respecto a la edad, resulta fuertemente mayor para los grupos de personas más jóvenes (13,6% y 15,2% para las personas de 16 a 24 años y de 25 a 34 años respectivamente, vs. inferior a 6% para las personas de 35 a 49 años y de 50 a 65 años). En relación al nivel de instrucción, cuando este aumenta la prevalencia de vida es mayor (crece de 4,1% para las personas con hasta primario incompleto hasta 11,3% para las personas con secundario completo y más). En relación al ingreso del hogar, dicha prevalencia aumenta a mayor ingreso, y resulta de 10,3% para las personas con ingreso del hogar entre \$1.251 y \$3.000. Para las personas con hogares sin ninguna necesidad básica insatisfecha la misma es de 8,7%.

Gráfico 3.2.1.2: Prevalencia de vida de consumo de sustancias psicoactivas ilegales, por sexo




Gráfico 3.2.1.3: Prevalencia de vida de consumo de sustancias psicoactivas ilegales, por edad




Gráfico 3.2.1.4: Prevalencia de vida de consumo de sustancias psicoactivas ilegales, por nivel de instrucción




Gráfico 3.2.1.5: Prevalencia de vida de consumo de sustancias psicoactivas ilegales, por ingreso del hogar





Gráfico 3.2.1.6: Prevalencia de vida de consumo de sustancias psicoactivas ilegales, por NBI total del hogar




Nota: la categoría "Más de un indicador" presenta baja participación en la población total (2,1%)

3.2.2 Prevalencia del último año

De las sustancias psicoactivas ilegales, la que tiene mayor prevalencia del último año es la marihuana, el 2,3% de las personas de 16 a 65 años de la Provincia la consumió alguna vez durante el último año. El resto de las sustancias no supera el 1%, de mayor a menor prevalencia se presentan, los alucinógenos, el crack y el éxtasis. Por otra parte no se presentaron casos de consumo en el último año de inhalables, opiáceos y anestésicos, y pasta base. Para la marihuana y cocaína, la prevalencia del último año es mayor en varones que en mujeres.

Gráfico 3.2.2.1: Prevalencia del último año de consumo de sustancias psicoactivas ilegales, por sustancia



La prevalencia del último año de consumo de por lo menos una sustancia ilegal es de 2,8%. Se presenta gráficamente la prevalencia del último año de consumo de por lo menos una sustancia ilegal, considerando sexo, edad, nivel de instrucción, ingreso del hogar, NBI total del hogar y autopercepción de la salud general de las personas.

Gráfico 3.2.2.2: Prevalencia del último año de consumo de sustancias psicoactivas ilegales, por sexo




Gráfico 3.2.2.3: Prevalencia del último año de consumo de sustancias psicoactivas ilegales, por edad




Gráfico 3.2.2.4: Prevalencia del último año de consumo de sustancias psicoactivas ilegales, por nivel de instrucción




Gráfico 3.2.2.5: Prevalencia del último año de consumo de sustancias psicoactivas ilegales, por ingreso del hogar






Gráfico 3.2.2.6: Prevalencia del último año de consumo de sustancias psicoactivas ilegales, por NBI total del hogar



Nota: la categoría "Más de un indicador" presenta baja participación en la población total (2,1%), y en la misma no se presentaron casos de consumo de sustancias psicoactivas ilegales en el último año.


Gráfico 3.2.2.7: Prevalencia del último año de consumo de sustancias psicoactivas ilegales, por autopercepción de la salud general



3.2.3 Prevalencia del último mes

De las sustancias psicoactivas ilegales, la que tiene mayor prevalencia del último mes es la marihuana, en segundo lugar continúa la cocaína, en tercer lugar los alucinógenos, y en cuarto lugar el éxtasis. Por otra parte, no se presentaron casos de consumo en el último mes con respecto al resto de las sustancias ilegales: crack, inhalables, opiáceos y anestésicos, y pasta base.

Gráfico 3.2.3.1: Prevalencia del último mes de consumo de sustancias psicoactivas ilegales, por sustancia



El 2,0% de las personas manifestó haber consumido al menos una sustancia ilegal en el último mes. Se presenta de forma gráfica la prevalencia del último mes de consumo de por lo menos una sustancia ilegal, considerando sexo, edad, nivel de instrucción, ingreso del hogar, NBI total del hogar y autopercepción de la salud general de las personas.

Gráfico 3.1.3.2: Prevalencia del último mes de consumo de sustancias psicoactivas ilegales, por sexo




Gráfico 3.2.3.3: Prevalencia del último mes de consumo de sustancias psicoactivas ilegales, por edad




Gráfico 3.2.3.4: Prevalencia del último mes de consumo de sustancias psicoactivas ilegales, por nivel de instrucción




Gráfico 3.2.3.5: Prevalencia del último mes de consumo de sustancias psicoactivas ilegales, por ingreso del hogar






Gráfico 3.2.3.6: Prevalencia del último mes de consumo de sustancias psicoactivas ilegales, por NBI total del hogar



Nota: la categoría "Más de un indicador" presenta baja participación en la población total (2,1%)

Gráfico 3.2.3.7: Prevalencia del último mes de consumo de sustancias psicoactivas ilegales, por autopercepción de la salud general




3.2.4 Dependencia de ciertas sustancias ilegales

Se analiza la dependencia⁹ de consumo para cuatro sustancias psicoactivas ilegales, en aquellas personas que las consumieron durante el último año. Estas sustancias son marihuana, cocaína, éxtasis y pasta base. Para la provincia de Santa Fe se presentan solamente los resultados correspondientes a marihuana debido a que las demás sustancias tienen baja participación de consumo para poder evaluar este aspecto.

El 22,2% de las personas de 16 a 65 años que consumieron marihuana en el último año presentan dependencia de consumo.

Gráfico 3.2.4.1: Población de 16 a 65 años que consumió marihuana durante el último año según dependencia de consumo de la misma



⁹ Se define a la dependencia como un patrón desadaptativo de consumo de la sustancia que conlleva un deterioro o malestar clínicamente significativos, expresado por una serie de acontecimientos (ver Anexo) en algún momento de un período continuado de 12 meses.


3.3 Fármacos

Dentro de las sustancias psicoactivas se encuentran los fármacos, compuestos por estimulantes, tranquilizantes, y medicamentos para adelgazar.

3.3.1 Prevalencia de vida

De los fármacos, los que tienen mayor prevalencia de vida son los medicamentos para adelgazar y los tranquilizantes, con 4,3% y 4,1% respectivamente, en último lugar se presentan los estimulantes (valor inferior a 1%). Con respecto a las mujeres el 6,6% de ellas ha consumido medicamentos para adelgazar alguna vez en su vida.

Gráfico 3.3.1.1: Prevalencia de vida de consumo de fármacos, por sustancia



Se analiza la prevalencia de vida de consumo de por lo menos un fármaco sin indicación médica, es decir el porcentaje de personas que consumió al menos un fármaco sin indicación médica alguna vez en su vida considerando, sexo, edad, nivel de instrucción, ingreso del hogar y NBI total del hogar.

La prevalencia de vida de consumo de por lo menos un fármaco es de 8,1%, en las mujeres es fuertemente mayor que en los varones (10,6% vs. 5,4%). Con respecto a la edad, resulta fuertemente mayor para los grupos con edades intermedias (10,9% para las personas de 25 a 34 años y 9,6% para las personas de 35 a 49 años). En relación al nivel de instrucción, la prevalencia de vida es mayor para las personas con secundario completo y más (10,5%) que para las personas con hasta secundario incompleto (5,8%). En relación al ingreso del hogar, dicha prevalencia es de 9,2% para las personas con ingreso del hogar entre \$1.251 y \$3.000. La prevalencia de vida de consumo de fármacos es de 9,0% para las personas con hogares sin ninguna necesidad básica insatisfecha.

Gráfico 3.3.1.2: Prevalencia de vida de consumo de fármacos, por sexo




Gráfico 3.3.1.3: Prevalencia de vida de consumo de fármacos, por edad




Gráfico 3.3.1.4: Prevalencia de vida de consumo de fármacos, por nivel de instrucción





Gráfico 3.3.1.5: Prevalencia de vida de consumo de fármacos, por ingreso del hogar



Gráfico 3.3.1.6: Prevalencia de vida de consumo de fármacos, por NBI total del hogar




Nota: la categoría "Más de un indicador" presenta baja participación en la población total (2,1%)

3.3.2 Prevalencia del último año

De los fármacos, los que tienen mayor prevalencia del último año son los tranquilizantes con 1,9%.

Gráfico 3.3.2.1: Prevalencia del último año de consumo de fármacos, por sustancia



La prevalencia del último año de consumo de por lo menos un fármaco es de 3,6%, en las mujeres es fuertemente mayor que en los varones. Con respecto a la edad, resulta mayor para los grupos de personas con edades intermedias. En relación al nivel de instrucción, la prevalencia del último año es mayor cuando aumenta el nivel de instrucción. En relación al ingreso del hogar, no se observan diferencias con respecto a dicha prevalencia. La prevalencia del último año es de 4,0% para las personas con hogares sin ninguna necesidad básica insatisfecha. Con respecto a la salud general, dicha prevalencia es de 3,4% para las personas con autopercepción excelente, muy buena o buena.

Gráfico 3.3.2.2: Prevalencia del último año de consumo de fármacos, por sexo




Gráfico 3.3.2.3: Prevalencia del último año de consumo de fármacos, por edad




Gráfico 3.3.2.4: Prevalencia del último año de consumo de fármacos, por nivel de instrucción




Gráfico 3.3.2.5: Prevalencia del último año de consumo de fármacos, por ingreso del hogar






Gráfico 3.3.2.6: Prevalencia del último año de consumo de fármacos, por NBI total del hogar



Nota: la categoría "Más de un indicador" presenta baja participación en la población total (2,1%), y en la misma no se presentaron casos de consumo de fármacos en el último año


Gráfico 3.3.2.7: Prevalencia del último año de consumo de fármacos, por autopercepción de la salud general



3.3.3 Prevalencia del último mes

De los fármacos, los que tienen mayor prevalencia del último mes son los tranquilizantes y los medicamentos para adelgazar, en último lugar se presentan los estimulantes.

Gráfico 3.3.3.1: Prevalencia del último mes de consumo de fármacos, por sustancia



La prevalencia del último mes de consumo de por lo menos un fármaco es de 1,8%. Se presenta gráficamente dicha prevalencia, es decir el porcentaje de personas que consumió al menos un fármaco sin indicación médica en el último mes considerando, sexo, edad, nivel de instrucción, ingreso del hogar, NBI total del hogar y auto percepción de la salud general de las personas.

Gráfico 3.3.3.2: Prevalencia del último mes de consumo de fármacos, por sexo




Gráfico 3.3.3.3: Prevalencia del último mes de consumo de fármacos, por edad




Gráfico 3.3.3.4: Prevalencia del último mes de consumo de fármacos, por nivel de instrucción





Gráfico 3.3.3.5: Prevalencia del último mes de consumo de fármacos, por ingreso del hogar




Gráfico 3.3.3.6: Prevalencia del último mes de consumo de fármacos, por NBI total del hogar



Nota: la categoría "Más de un indicador" presenta baja participación en la población total (2,1%), y en la misma no se presentaron casos de consumo de fármacos en el último mes

Gráfico 3.3.3.7: Prevalencia del último mes de consumo de fármacos, por autopercepción de la salud general



3.4 Edad de inicio de consumo de las sustancias psicoactivas

Para las personas de 16 a 65 años que consumieron ciertas sustancias psicoactivas se analiza la edad en la que las probaron por primera vez. Este aspecto se puede analizar en las siguientes sustancias: tabaco, bebidas alcohólicas, cocaína, marihuana, medicamentos para adelgazar y tranquilizantes (debido al alto nivel de consumo).

A continuación se enumeran dichas sustancias de menor a mayor edad promedio de inicio: tabaco y bebidas alcohólicas (edad promedio de 16,6 y 17,2 años respectivamente), marihuana y cocaína (19,3 y 21,0 años respectivamente), medicamentos para adelgazar y tranquilizantes (27,2 y 28,6 años respectivamente).

Si se analiza cual fue la edad mínima de inicio en estas sustancias se observa que las más bajas se encuentran en bebidas alcohólicas (5 años), marihuana (6 años), y tabaco, (8 años). Por otra parte, las más altas se observan en medicamentos para adelgazar y cocaína (en ambos casos 15 años), y tranquilizantes (14 años).

Si se considera cual fue la edad máxima de inicio en estas sustancias se observa que las más bajas se encuentran en tabaco (42 años), y cocaína (45 años). Por otra parte, las más altas se observan en bebidas alcohólicas (59 años), marihuana y medicamentos para adelgazar (en ambos casos 55 años), y tranquilizantes (54 años),

En todas las sustancias se observa una gran diferencia entre la edad de inicio mínima y la edad de inicio máxima. Las sustancias que presentan mayor rango de variación son bebidas alcohólicas (entre 5 y 59 años), marihuana (entre 6 y 55 años), medicamentos para adelgazar (entre 15 y 55 años), y tranquilizantes (entre 14 y 54 años). Por otra parte las que presentan menor rango de variación son cocaína (entre 14 y 45 años) y tabaco (entre 8 y 42 años).

Gráfico 3.4.1: Distribución de la edad de inicio de consumo de sustancias psicoactivas legales o sociales






Gráfico 3.4.2: Distribución de la edad de inicio de consumo de sustancias psicoactivas ilegales



Notas: * Las sustancias están ordenadas de menor a mayor edad de inicio promedio de consumo
 * Las sustancias ilegales *Crack*, *Pasta base*, *Opiáceos y anestésicos*, *Otras drogas*, *Alucinógenos*, *Éxtasis* e *Inhalables* presentan pocas observaciones muestrales

Gráfico 3.4.3: Distribución de la edad de inicio de consumo de fármacos




Notas: * Las sustancias están ordenadas de menor a mayor edad de inicio promedio de consumo
 * Los *estimulantes* presentan pocas observaciones muestrales

4. DEMANDA DE TRATAMIENTO

En esta sección se indagó a las personas de 16 a 65 años que consumieron alguna vez en su vida alguna de las sustancias psicoactivas sobre la búsqueda de profesionales para tratar de disminuir el consumo de las mismas. En el caso de que hayan buscado ayuda se les preguntó si asistieron a determinados lugares, por consumo de sustancias psicoactivas, y si han estado en tratamiento por este motivo.

El 97,0% de la población de 16 a 65 años que consumió alguna vez en su vida alguna de las sustancias psicoactivas, manifestó no haber buscado ayuda profesional para tratar de disminuir el consumo de alcohol, tabaco u otras drogas, mientras que el 2,8% manifestó haberlo hecho.

Gráfico 4.1: Población de 16 a 65 años que consumió alguna vez en su vida alguna sustancia psicoactiva, según haya buscado ayuda profesional para tratar de disminuir el consumo de las mismas



Si se relaciona este aspecto con las sustancias con mayor prevalencia del último año de consumo, marihuana y cocaína, se observa que en proporción la dependencia de cocaína es mayor que la dependencia de marihuana (76,0% y 22,2% respectivamente). De las personas con dependencia de consumo de marihuana el 48,2% buscó ayuda profesional, y con respecto a la cocaína sólo lo hizo el 18,2%.

Si se la relaciona con el abuso de bebidas alcohólicas, se observa que la proporción de personas con algún tipo de abuso que buscó ayuda profesional, en general, es bajo. Se presentan estos resultados con respecto a las dos situaciones que presentan mayor abuso; *total combinado de bebidas alcohólicas* (22,1%) y *bebidas alcohólicas en fin de semana* (21,6%). Con respecto a las personas con abuso *total combinado de bebidas alcohólicas* el 2,8% buscó ayuda profesional, y con respecto al abuso de *bebidas alcohólicas en fin de semana* lo hizo el 2,9%.


Si se relaciona la búsqueda de ayuda profesional con el consumo episódico excesivo de bebidas alcohólicas, se observa que la proporción de personas con algún tipo de consumo episódico excesivo que buscó ayuda profesional, en general, es baja. Se presentan estos resultados con respecto a las dos situaciones que presentan mayor consumo; *total combinado de bebidas alcohólicas* (30,6%) y *bebidas alcohólicas en fin de semana* (30,9%). Con respecto a las personas con *consumo episódico excesivo de total combinado de bebidas alcohólicas* el 3,0% buscó ayuda profesional, y con respecto a las *bebidas alcohólicas en fin de semana* lo hizo el 3,0%.

Con respecto a las personas, de 16 a 65 años, que consumieron alguna vez en su vida alguna sustancia psicoactiva y que buscaron ayuda profesional para tratar de disminuir el consumo de alcohol, tabaco u otras drogas (2,4% de la población total), se analiza el porcentaje que concurrió a ciertos lugares de asistencia.

Los lugares más frecuentes en donde se buscó ayuda profesional son los siguientes: en primer lugar y con una marcada diferencia "consultorios externos" (35,4%), luego "grupos de autoayuda para problemas de tabaquismo", "hospitales generales" e "iglesias o grupos religiosos" (valores entre 19% y 21%).

En menor medida, las personas asistieron a "clínicas psiquiátricas" y a "centros de salud mental" (valores entre 10% y 14%). Los lugares menos concurridos fueron "servicios gratuitos de líneas telefónicas", "comunidades terapéuticas", "alcohólicos anónimos", y "centros de desintoxicación" (valores entre 1% y 6%). Por otra parte no hubo personas que hayan manifestado asistir a "narcóticos anónimos" y a "centros de alcoholismo".

Gráfico 4.2: Población de 16 a 65 años que consumió alguna vez en su vida sustancias psicoactivas y buscó ayuda profesional para tratar de disminuir el consumo de las mismas, según asistencia a ciertos lugares, por lugar



Nota: no hubo personas que hayan asistido a "Centros de alcoholismo" y a "Narcóticos Anónimos"

De la población de 16 a 65 años que consumió alguna vez en su vida alguna sustancia psicoactiva y buscó ayuda profesional para tratar de disminuir el consumo de las mismas (2,4% de la población total), se analiza si está o estuvo en tratamiento por consumo de sustancias. Más de la mitad de dichas personas nunca estuvo en tratamiento (55,5%), luego predominan las personas que alguna vez estuvieron en tratamiento, mientras que un menor porcentaje manifestó estar actualmente en tratamiento.

Gráfico 4.3: Población de 16 a 65 años que consumió alguna vez en su vida alguna sustancia psicoactiva y que buscó ayuda profesional para tratar de disminuir el consumo de las mismas, según realización de tratamiento por consumo de sustancias



Se observa si las personas de 16 a 65 años con dependencia de consumo de marihuana y cocaína están o estuvieron en tratamiento por consumo de sustancia. La totalidad de personas con dependencia de consumo de marihuana manifestó que nunca estuvo en tratamiento. Con respecto a las personas con dependencia de consumo de cocaína, un tercio manifestó que actualmente está en tratamiento (33,9%), mientras que el resto nunca lo estuvo.

También se observa si las personas con abuso de bebidas alcohólicas están o estuvieron en tratamiento. La mayoría de las personas con algún tipo de abuso de bebidas alcohólicas manifestó que nunca estuvo en tratamiento, y el resto que estuvo alguna vez en tratamiento, pero no se observaron casos en que actualmente estén en tratamiento. Se presentan las dos situaciones de mayor abuso: *total combinado de bebidas alcohólicas* y *bebidas alcohólicas en fin de semana*. El 7,0% de las personas con abuso de total combinado de bebidas alcohólicas manifestó que alguna vez estuvo en tratamiento, con respecto al *abuso de bebidas alcohólicas en fin de semana* el mismo porcentaje.

Por último se analiza si las personas con consumo episódico excesivo de bebidas alcohólicas están o estuvieron en tratamiento. La mayoría de las personas con algún tipo de consumo episódico excesivo de bebidas alcohólicas manifestó que nunca estuvo en tratamiento, y el resto que estuvo alguna vez en tratamiento, pero no se observaron casos en que actualmente estén en tratamiento. Se presentan las dos situaciones de mayor consumo episódico excesivo: *total combinado de bebidas alcohólicas* y *bebidas alcohólicas en fin de semana*. El 28,0% de las personas con consumo episódico excesivo de *total combinado de bebidas alcohólicas* manifestó que alguna vez estuvo en tratamiento, y con respecto a consumo de *bebidas alcohólicas en fin de semana*, el mismo porcentaje.


5. OPINIÓN SOBRE EL RIESGO DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

En esta sección, se presenta la opinión que tienen las personas de 16 a 65 años, sobre el riesgo que se corre al consumir ciertas sustancias psicoactivas, de forma frecuente, y ocasionalmente. Las sustancias consideradas son bebidas alcohólicas, cigarrillos, marihuana, cocaína, pasta base, éxtasis, tranquilizantes y estimulantes.

Con respecto a tomar bebidas alcohólicas de vez en cuando, aproximadamente la mitad de las personas de 16 a 65 años manifestó que el riesgo es leve o moderado (47,8%), el 25,5% opina que corre un gran riesgo, y el 23,7% opina que no corre ningún riesgo.

Por otra parte, con respecto a tomar bebidas alcohólicas frecuentemente, la mayoría de las personas opina que se corre un gran riesgo (86,2%) y el 10,5% opina que el riesgo es leve o moderado.


Gráfico 5.1: Población de 16 a 65 años según opinión sobre el riesgo que corre una persona que toma bebidas alcohólicas, por frecuencia de consumo



Con respecto a que una persona fume cigarrillos de vez en cuando, el 45,5% de las personas de 16 a 65 años manifestó que el riesgo que corre es leve o moderado, el 45,1% opina que corre un gran riesgo, y sólo el 6,6% opina que no corre ningún riesgo.

Por otra parte, con respecto a fumar cigarrillos frecuentemente, la mayoría de las personas opina que se corre un gran riesgo (91,6%) y el 5,6% opina que el riesgo es leve o moderado.


Gráfico 5.2: Población de 16 a 65 años según opinión sobre el riesgo que corre una persona que fuma cigarrillos, por frecuencia de consumo



Con respecto a que una persona consume de vez en cuando marihuana, más de la mitad de las personas de 16 a 65 años manifestó que corre un gran riesgo (61,0%), y una cuarta parte manifestó que el riesgo es leve o moderado (25,6%), y el 5,0% opina que no corre ningún riesgo. Por otra parte, el 8,4% de las personas no sabe que riesgo se corre.

Con respecto a consumirla frecuentemente, la mayoría de las personas opina que se corre un gran riesgo (84,5%) y el 6,9% opina que el riesgo es leve o moderado. Por otra parte, el 7,8% de las personas no sabe que riesgo se corre.


Gráfico 5.3: Población de 16 a 65 años según opinión sobre el riesgo que corre una persona que consume marihuana, por frecuencia de consumo



En el caso de que una persona consume de vez en cuando cocaína, la mayoría de las personas de 16 a 65 años manifestó que corre un gran riesgo (78,2%) y el 14,2% manifestó que el riesgo es leve o moderado. Por otra parte, el 6,3% de las personas no sabe que riesgo se corre.

Con respecto al consumir frecuente, la mayoría de las personas opina que se corre un gran riesgo (93,9%), por otra parte el 5,2% de las personas no sabe que riesgo se corre.


Gráfico 5.4: Población de 16 a 65 años según opinión sobre el riesgo que corre una persona que consume cocaína, por frecuencia de consumo



En el caso de que una persona consume pasta base de vez en cuando, la mayoría de las personas manifestó que corre un gran riesgo (80,4%) y el 7,3% manifestó que el riesgo es leve o moderado. Por otra parte, el 12,1% de las personas no sabe que riesgo se corre.

Con respecto a consumir frecuentemente dicha sustancia, la mayoría de las personas opina que se corre un gran riesgo (87,9%). Por otra parte, el 11,7% de las personas no sabe que riesgo se corre.


Gráfico 5.5: Población de 16 a 65 años según opinión sobre el riesgo que corre una persona que consume pasta base, por frecuencia de consumo



En el caso de que una persona consume éxtasis de vez en cuando, la mayoría de las personas de 16 a 65 años manifestó que corre un gran riesgo (73,5%) y el 9,9% manifestó que el riesgo es leve o moderado. Por otra parte, el 16,0% de las personas no sabe que riesgo se corre.

Con respecto al consumo frecuente, la mayoría de las personas opina que se corre un gran riesgo (84,1%). Por otra parte, el 15,1% de las personas no sabe que riesgo se corre.


Gráfico 5.6: Población de 16 a 65 años según opinión sobre el riesgo que corre una persona que consume éxtasis, por frecuencia de consumo



Con respecto a que una persona consume tranquilizantes sin indicación médica de vez en cuando, el 40,7% de las personas manifestó que corre un gran riesgo, el 37,0% manifestó que el riesgo es leve o moderado, y el 8,0% opina que no corre ningún riesgo. Por otra parte, el 14,4% de las personas no sabe que riesgo corre.

Con respecto a consumir dicha sustancia frecuentemente, la mayoría de las personas opina que se corre un gran riesgo (79,6%) y el 6,9% opina que el riesgo es leve o moderado. Por otra parte, el 12,6% de las personas no sabe que riesgo se corre.


Gráfico 5.7: Población de 16 a 65 años según opinión sobre el riesgo que corre una persona que consume tranquilizantes sin indicación médica, por frecuencia de consumo



En el caso de que una persona consume estimulantes sin indicación médica de vez en cuando, la mitad de las personas manifestó que corre un gran riesgo, el 27,5% manifestó que el riesgo es leve o moderado, y el 3,4% opina que no corre ningún riesgo. Por otra parte, el 18,5% de las personas no sabe que riesgo corre.

Con respecto a consumirlos frecuentemente, la mayoría de las personas opina que se corre un gran riesgo (77,7%) y el 4,6% opina que el riesgo es leve o moderado. Por otra parte, el 17,4% de las personas no sabe que riesgo se corre.

Gráfico 5.8: Población de 16 a 65 años según opinión sobre el riesgo que corre una persona que consume estimulantes sin indicación médica, por frecuencia de consumo




Una mayor cantidad de personas opina que se corre un gran riesgo del consumo esporádico (o de vez en cuando) tanto para pasta base, cocaína como éxtasis (80,4%, 78,2%, y 73,5% respectivamente). Mientras que una menor cantidad de personas tiene esta opinión en el caso de las bebidas alcohólicas, los tranquilizantes sin indicación

médica y los cigarrillos (25,5%, 40,7%, y 45,1% respectivamente).

Una mayor cantidad de personas opina que no se corre ningún riesgo con respecto al consumo esporádico en el caso de las bebidas alcohólicas, los tranquilizantes sin indicación médica y los cigarrillos (23,7%, 8,0%, y 6,6% respectivamente). Mientras que una menor cantidad de personas tiene dicha opinión en el caso de la pasta base, el éxtasis, y la cocaína.


Gráfico 5.9: Población de 16 a 65 años según opinión sobre el riesgo que corre una persona que consume de vez en cuando sustancias psicoactivas, por sustancia



Una mayor cantidad de personas opina que se corre un gran riesgo del consumo frecuente en el caso de la cocaína, los cigarrillos, la pasta base, y las bebidas alcohólicas (93,9%, 91,6%, 87,9% y 86,2% respectivamente). Mientras que una menor cantidad de personas tiene esta opinión en el caso de los estimulantes y de los tranquilizantes, ambos sin indicación médica (77,7% y 79,6% respectivamente).

Con respecto a la opinión acerca de que no se corre ningún riesgo del consumo frecuente, en cada una de las sustancias, es inferior al 1%.

Gráfico 5.10: Población de 16 a 65 años según opinión sobre el riesgo que corre una persona que consume frecuentemente sustancias psicoactivas, por sustancia



ANEXO

1. ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Cuadro 1.1: Población de 16 a 65 años según sexo

SEXO	Cantidad	%
Total	1.773.475	100,0
Varón	836.080	47,1
Mujer	937.395	52,9

Cuadro 1.2: Población de 16 a 65 años según edad

EDAD	Cantidad	%
Total	1.773.475	100,0
16 a 24 años	475.790	26,8
25 a 34 años	400.058	22,6
35 a 49 años	455.183	25,7
50 a 65 años	442.444	24,9

Cuadro 1.3: Población de 16 a 65 años según nivel de instrucción

NIVEL DE INSTRUCCIÓN	Cantidad	%
Total	1.773.475	100,0
Sin instrucción	..	1,4
Primario incompleto	83.896	4,7
Primario completo	386.030	21,8
Secundario incompleto	395.214	22,3
Secundario completo	378.461	21,3
Terciario o universitario incompleto	253.264	14,3
Terciario o universitario completo y más	249.548	14,1
Educación especial	..	0,1

Cuadro 1.4: Población de 16 a 65 años según condición de actividad

CONDICIÓN DE ACTIVIDAD	Cantidad	%
Total	1.773.475	100,0
Ocupado	1.194.280	67,3
Desocupado	65.363	3,7
Inactivo	513.832	29,0

Cuadro 1.5: Población de 16 a 65 años según cobertura de salud

COBERTURA DE SALUD	Cantidad	%
Total	1.773.475	100,0
Plan Privado	414.650	23,4
Obra social	786.457	44,3
Plan o servicio público o servicio de emergencia	38.326	2,2
No está asociado a nada	497.480	28,0
Ns/Nc	36.562	2,1

.. Estimaciones con coeficiente de variación mayor a 20%

- Valor cero



Cuadro 1.6: Población de 16 a 65 años según ingreso mensual del hogar

INGRESO DEL HOGAR	Cantidad	%
Total	1.773.475	100,0
\$0 a \$1.250	519.721	29,3
\$1.251 a \$3.000	769.632	43,4
\$3.000 y más	286.623	16,2
Ns/Nr	197.499	11,1

Cuadro 1.7: Población de 16 a 65 años según NBI total del hogar

NBI TOTAL DEL HOGAR	Cantidad	%
Total	1.773.475	100,0
Ningún indicador de NBI	1.540.016	86,8
Un indicador de NBI	196.824	11,1
Más de un indicador de NBI	36.635	2,1

Cuadro 1.8: Población de 16 a 65 años según aglomerado urbano

AGLOMERADO URBANO	Cantidad	%
Total	1.773.475	100,0
Gran Rosario	852.761	48,1
Resto de los aglomerados	920.714	51,9

2. AUTOPERCEPCIÓN DE LA SALUD Y ENTORNO

2.1 Acceso y entorno

Cuadro 2.1.1: Población de 16 a 65 años según autopercepción de la salud general

AUTOPERCEPCIÓN DE LA SALUD GENERAL	Cantidad	%	
		%	% combinado
Total	1.773.475	100	100,0
Excelente	164.852	9,3	
Muy buena	528.998	29,8	86,6
Buena	842.329	47,5	
Regular	213.936	12,1	
Mala	..	1,3	13,4

Cuadro 2.1.2: Población de 16 a 65 años según autopercepción de la salud general, por sexo

AUTOPERCEPCIÓN DE LA SALUD GENERAL	SEXO				Total	
	Varón	Mujer	%	%		
Total	836.080	937.395	100	100	1.773.475	100,0
Excelente, muy buena o buena	735.808	800.371	88	85,4	1.536.179	86,6
Regular o mala	100.272	137.024	12	14,6	237.296	13,4

.. Estimaciones con coeficiente de variación mayor a 20%

- Valor cero



Cuadro 2.1.3: Población de 16 a 65 años según autopercepción de la salud general, por edad

AUTOPERCEPCIÓN DE LA SALUD GENERAL	EDAD								Total	
	16 a 24 años		25 a 34 años		35 a 49 años		50 a 65 años			
		%		%		%		%		
Total	475.790	100,0	400.058	100,0	455.183	100,0	442.444	100,0	1.773.475	100,0
Excelente, muy buena o buena	445.776	93,7	362.944	90,7	398.677	87,6	328.782	74,3	1.536.179	86,6
Regular o mala	..	6,3	..	9,3	56.506	12,4	113.662	25,7	237.296	13,4

Cuadro 2.1.4: Población de 16 a 65 años según autopercepción de la salud general, por nivel de instrucción

AUTOPERCEPCIÓN DE LA SALUD GENERAL	NIVEL DE INSTRUCCIÓN							Total		
	Hasta primario incompleto	Hasta secundario incompleto	Secundario completo y más	Educación especial						
		%	%	%	%	%	%			
Total	108.681	100,0	781.244	100,0	881.273	100,0	2.277	100,0	1.773.475	100,0
Excelente, muy buena o buena	77.198	71,0	639.011	81,8	817.693	92,8	..	100,0	1.536.179	86,6
Regular o Mala	..	29,0	142.233	18,2	63.580	7,2	-	-	237.296	13,4

Cuadro 2.1.5: Población de 16 a 65 años según autopercepción de la salud general, por condición de actividad

AUTOPERCEPCIÓN DE LA SALUD GENERAL	CONDICIÓN DE ACTIVIDAD						Total	
	Ocupado		Desocupado		Inactivo			
		%		%		%		
Total	1.194.280	100,0	65.363	100,0	513.832	100,0	1.773.475	100,0
Excelente, muy buena o buena	1.064.676	89,2	48.552	74,3	422.951	82,3	1.536.179	86,6
Regular o mala	129.604	10,8	..	25,7	90.881	17,7	237.296	13,4

Cuadro 2.1.6: Población de 16 a 65 años según autopercepción de la salud general, por cobertura de salud

AUTOPERCEPCIÓN DE LA SALUD GENERAL	COBERTURA DE SALUD								Total			
	Plan privado	Obra social	Plan o serv. público o serv. emergencia	No está asociado a nada	Ns/Nc							
		%	%	%	%	%	%	%				
Total	414.650	100,0	786.457	100,0	..	100,0	497.480	100,0	..	100,0	1.773.475	100,0
Excelente, muy buena o buena	370.748	89,4	695.310	88,4	..	80,6	405.912	81,6	..	91,1	1.536.179	86,6
Regular o Mala	43.902	10,6	91.147	11,6	..	19,4	91.568	18,4	..	8,9	237.296	13,4

Cuadro 2.1.7: Población de 16 a 65 años según autopercepción de la salud general, por ingreso del hogar

AUTOPERCEPCIÓN DE LA SALUD GENERAL	INGRESO DEL HOGAR							Total		
	\$0 a \$1.250	\$1.251 a \$3.000	\$3.000 y más	Ns/Nr						
		%	%	%	%	%	%			
Total	519.721	100,0	769.632	100,0	286.623	100,0	197.499	100,0	1.773.775	100,0
Excelente, muy buena o buena	412.614	79,4	674.480	87,6	273.267	95,3	175.818	89,0	1.536.441	86,6
Regular o Mala	107.107	20,6	95.152	12,4	..	4,7	..	11,0	237.334	13,4

.. Estimaciones con coeficiente de variación mayor a 20%

- Valor cero



Cuadro 2.1.8: Población de 16 a 65 años según autopercepción de la salud general, por NBI total del hogar

AUTOPERCEPCIÓN DE LA SALUD GENERAL	NBI TOTAL DEL HOGAR						Total	%
	Ningún indicador	Un indicador		Más de un indicador				
		%		%		%		%
Total	1.540.016	100,0	196.824	100,0	36.635	100,0	1.773.675	100,0
Excelente, muy buena o buena	1.361.471	88,4	145.901	74,1	..	78,6	1.536.342	86,6
Regular o Mala	178.545	11,6	50.923	25,9	..	21,4	237.333	13,4

Cuadro 2.1.9: Población de 16 a 65 años según ocurrencia de ciertos acontecimientos en los últimos 12 meses

OCURRENCIA	Durante los últimos 12 meses...					
	Accidente	Enfermedad		Visita a profesional de la salud		
		%		%		%
Total	1.773.475	100,0	1.773.475	100,0	1.773.475	100,0
Si	127.082	7,2	334.574	18,9	290.872	16,4
No	1.644.629	92,7	1.436.007	81	1.482.122	83,57
Ns/Nc	..	0,1	..	0,1	..	0,03

Acontecimientos: * Sufrimiento de algún accidente que le haya impedido realizar las actividades habituales por uno o más días;

* Sufrimiento de una enfermedad por la que debió guardar cama o reposo bajo consejo médico;

* Visita a algún profesional de la salud por problemas de angustia, relaciones personales, depresión u otros.

Cuadro 2.1.10: Población de 16 a 65 años según ocurrencia de ciertos acontecimientos en los últimos 12 meses, por sexo

OCURRENCIA		SEXO			
		Varón		Mujer	
			%		%
Accidente	Total	836.080	100,0	937.395	100,0
	Si	69.941	8,4	57.141	6,1
	No	764.375	91,4	880.254	93,9
	Ns/Nc	..	0,2	-	-
Enfermedad	Total	836.080	100,0	937.395	100,0
	Si	170.725	20,4	163.849	17,5
	No	663.591	79,4	772.416	82,4
	Ns/Nc	..	0,2	..	0,1
Visita a profesional de la salud	Total	836.080	100,0	937.395	100,0
	Si	92.811	11,1	198.061	21,1
	No	743.269	88,9	738.853	78,8
	Ns/Nc	-	-	..	0,1

Acontecimientos: * Sufrimiento de algún accidente que le haya impedido realizar las actividades habituales por uno o más días;

* Sufrimiento de una enfermedad por la que debió guardar cama o reposo bajo consejo médico;

* Visita a algún profesional de la salud por problemas de angustia, relaciones personales, depresión u otros.

.. Estimaciones con coeficiente de variación mayor a 20%

- Valor cero

Cuadro 2.1.11: Población de 16 a 65 años que haya vivido ciertos acontecimientos en los últimos 12, según autopercepción de la salud general

AUTOPERCEPCIÓN DE LA SALUD GENERAL	OCURRENCIA					
	Accidente		Enfermedad		Visita a profesional de la salud	
		%		%		%
Total	127.082	7,2	334.574	18,9	290.872	16,4
Excelente, muy buena o buena	83.270	5,4	248.561	16,2	203.800	13,3
Regular o Mala	43.812	18,5	86.013	36,2	87.072	36,7

Acontecimientos: * Sufrimiento de algún accidente que le haya impedido realizar las actividades habituales por uno o más días;

* Sufrimiento de una enfermedad por la que debió guardar cama o reposo bajo consejo médico;

* Visita a algún profesional de la salud por problemas de angustia, relaciones personales, depresión u otros.

2.2 Acceso y entorno

Cuadro 2.2.1: Población de 16 a 65 años según conocimiento de personas cercanas que en la actualidad consuman alguna sustancia ilegal

CONOCE PERSONAS QUE CONSUMAN SUSTANCIAS	Cantidad	%
Total	1.773.475	100,0
Si	533.355	30,1
No	1.228.055	69,2
Ns/Nc	..	0,7

Cuadro 2.2.2: Población de 16 a 65 años según conoce personas cercanas que en la actualidad consuman alguna sustancia ilegal, por sexo

CONOCE PERSONAS QUE CONSUMAN SUSTANCIAS ILEGALES	SEXO				Total	
	Varón		Mujer			
		%		%		%
Total	836.080	100,0	937.395	100,0	1.773.575	100,0
Si	280.635	33,6	252.720	27,0	533.389	30,1
No	552.400	66,1	675.655	72,1	1.228.121	69,2
Ns/Nc	..	0,3	..	0,9	..	0,7

Cuadro 2.2.3: Población de 16 a 65 años conoce personas cercanas que en la actualidad consuman alguna sustancia ilegal, por edad

CONOCE PERSONAS QUE CONSUMAN SUSTANCIAS ILEGALES	EDAD								Total	
	16 a 24 años		25 a 34 años		35 a 49 años		50 a 65 años			
		%		%		%		%		%
Total	475.790	100,0	400.058	100,0	455.183	100,0	442.442	100,0	1.773.473	100,0
Si	216.598	45,5	147.308	36,8	109.523	24,1	59.926	13,6	533.355	30,1
No	252.977	53,2	249.705	62,4	345.660	75,9	379.713	85,8	1.228.055	69,2
Ns/Nc	..	1,3	..	0,8	-	-	..	0,6	..	0,7

.. Estimaciones con coeficiente de variación mayor a 20%

- Valor cero

Cuadro 2.2.4: Población de 16 a 65 años que conoce personas cercanas que en la actualidad consuman alguna sustancia psicoactiva, según cantidad de personas que conoce

CANTIDAD DE PERSONAS QUE CONOCE	CANTIDAD DE PERSONAS	
	Cantidad	%
Total	533.355	100,0
Una	59.286	11,1
Dos o más	466.822	87,5
Ns/Nc	..	1,4

Cuadro 2.2.5: Población de 16 a 65 años según curiosidad por probar alguna sustancia ilegal

CURIOSIDAD	Cantidad	%
Total	1.773.475	100,0
Si	217.124	12,2
No	1.497.073	84,4
Puede ser	..	1,5
Ns/Nc	..	1,9

Cuadro 2.2.6: Población de 16 a 65 años según curiosidad por probar alguna sustancia ilegal, por sexo

CURIOSIDAD	SEXO				Total	
	Varón		Mujer			
		%		%		%
Total	836.080	100,0	937.395	100,0	1.773.575	100,0
Si	122.408	14,6	94.716	10,1	217.139	12,2
No	686.270	82,1	810.803	86,5	1.497.155	84,4
Puede ser	..	2,1	..	0,9	..	1,5
Ns/Nc	..	1,2	..	2,5	..	1,9

Cuadro 2.2.7: Población de 16 a 65 años según curiosidad por probar alguna sustancia ilegal, por edad

CURIOSIDAD	EDAD								Total	
	16 a 24 años		25 a 34 años		35 a 49 años		50 a 65 años			
		%		%		%		%		%
Total	475.790	100,0	400.058	100,0	455.183	100,0	442.444	100,0	1.773.475	100,0
Si	95.032	20	68.625	17,2	42.214	9,3	..	2,5	217.124	12,2
No	360.674	75,8	323.778	80,9	400.290	87,9	412.331	93,2	1.497.073	84,4
Puede ser	..	3,2	..	0,7	..	1,0	..	0,7	..	1,5
Ns/Nc	..	1,0	..	1,2	..	1,8	..	3,6	..	1,9

Cuadro 2.2.8: Población de 16 a 65 años según posibilidad de probar alguna sustancia ilegal

POSIBILIDAD DE PROBAR	Cantidad	%
Total	1.773.475	100,0
Si	518.007	29,2
No	1.211.494	68,3
Ns/Nc	43.974	2,5

.. Estimaciones con coeficiente de variación mayor a 20%

- Valor cero

Cuadro 2.2.9: Población de 16 a 65 años según posibilidad de probar alguna sustancia ilegal, por sexo

POSIBILIDAD DE PROBAR	SEXO				Total	
	Varón		Mujer			
		%		%		%
Total	836.080	100,0	937.395	100,0	1.773.575	100,0
Si	310.941	37,2	207.066	22,1	518.044	29,2
No	507.780	60,7	703.714	75,1	1.211.555	68,3
Ns/Nc	..	2,1	..	2,8	43.976	2,5

Cuadro 2.2.10: Población de 16 a 65 años según posibilidad de probar alguna sustancia ilegal, por edad

POSIBILIDAD DE PROBAR	EDAD								Total	
	16 a 24 años		25 a 34 años		35 a 49 años		50 a 65 años			
		%		%		%		%		%
Total	475.790	100,0	400.058	100,0	455.183	100,0	442.444	100,0	1.773.775	100,0
Si	183.746	38,6	163.563	40,9	117.072	25,7	53.626	12,1	518.112	29,2
No	285.136	59,9	231.751	57,9	328.214	72,1	366.393	82,8	1.211.684	68,3
Ns/Nc	..	1,5	..	1,2	..	2,2	..	5,1	43.979	2,5

Cuadro 2.2.11: Población de 16 a 65 años que tuvo la posibilidad de probar alguna sustancia ilegal, según cantidad de veces

CANTIDAD DE POSIBILIDADES DE PROBAR	Cantidad	
	Cantidad	%
Total	518.007	100,0
Una	104.544	20,2
Dos o más	401.483	77,5
Ns/Nc	..	2,3

Cuadro 2.2.12: Población de 16 a 65 años según probaría o no alguna sustancia ilegal si tuviera la ocasión

SI TUVIERA LA OCASIÓN, ¿PROBARÍA ALGUNA?	Cantidad	
	Cantidad	%
Total	1.773.475	100
Si	65.741	3,7
No	1.615.416	91,1
Puede ser	38.668	2,2
Ns/Nc	53.650	3

Cuadro 2.2.13: Población de 16 a 65 años según probaría o no alguna sustancia ilegal si tuviera la ocasión, por sexo

SI TUVIERA LA OCASIÓN, ¿PROBARÍA ALGUNA?	SEXO				Total	
	Varón		Mujer			
		%		%		%
Total	836.080	100,0	937.395	100,0	1.773.475	100,0
Si	..	4,2	..	3,3	65.741	3,7
No	760.273	90,9	855.143	91,2	1.615.416	91,1
Puede ser	..	2,6	..	1,8	38.668	2,2
Ns/Nc	..	2,3	..	3,7	53.650	3,0

.. Estimaciones con coeficiente de variación mayor a 20%

- Valor cero

Cuadro 2.2.14: Población de 16 a 65 años según probaría o no alguna sustancia ilegal si tuviera la ocasión, por edad

SI TUVIERA LA OCASIÓN, ¿PROBARÍA ALGUNA?	EDAD								Total	%
	16 a 24 años		25 a 34 años		35 a 49 años		50 a 65 años			
Total	475.790	100,0	400.058	100,0	455.183	100,0	442.444	100,0	1.773.475	100,0
Si	..	6,5	..	5,2	..	2,1	..	1,0	65.741	3,7
No	404.506	85,0	362.751	90,7	430.603	94,6	417.556	94,4	1.615.416	91,1
Puede ser	..	5,0	..	1,8	..	1,3	..	0,5	38.668	2,2
Ns/Nc	..	3,5	..	2,3	..	2,0	..	4,1	53.650	3,0

Cuadro 2.2.15: Personas de 16 a 65 años según facilidad para conseguir sustancias psicoactivas, por sustancia

GRADO DE FACILIDAD PARA CONSEGUIR LA SUSTANCIA	SUSTANCIA											
	Tranquilizantes		Estimulantes		Marihuana		Cocaína		Pasta Base		Éxtasis	
Total	1.773.475	100,0										
Me sería fácil	799.378	45,1	634.899	35,8	862.120	48,6	720.228	40,6	463.990	26,2	450.733	25,4
Me sería difícil	422.090	23,8	447.032	25,2	278.341	15,7	360.065	20,3	372.516	21,0	395.784	22,3
No podría conseguir	296.702	16,7	372.422	21,0	366.323	20,7	398.650	22,5	523.010	29,5	507.687	28,6
Ns/Nc	255.305	14,4	319.122	18,0	266.691	15,0	294.532	16,6	413.959	23,3	419.271	23,7

Cuadro 2.2.16: Personas de 16 a 65 años según facilidad para conseguir cada sustancia psicoactiva según edad

SUSTANCIA	FACILIDAD PARA CONSEGUIR	EDAD							
		16 a 24 años		25 a 34 años		35 a 49 años		50 a 65 años	
Tranquilizantes	Total	475.790	100,0	400.058	100,0	455.183	100,0	442.444	100,0
	Me sería fácil	201.163	42,3	199.688	49,9	241.949	53,2	156.578	35,4
	Me sería difícil	113.314	23,8	81.009	20,2	103.616	22,8	124.151	28,1
	No podría conseguir	84.255	17,7	59.515	14,9	58.838	12,9	94.094	21,3
	Ns/Nc	77.058	16,2	59.846	15,0	50.780	11,2	67.621	15,3
Estimulantes	Total	475.790	100,0	400.058	100,0	455.183	100,0	442.444	100,0
	Me sería fácil	178.596	37,5	160.945	40,2	177.932	39,1	117.426	26,5
	Me sería difícil	107.755	22,6	94.078	23,5	113.045	24,8	132.154	29,9
	No podría conseguir	100.987	21,2	73.607	18,4	90.528	19,9	107.300	24,3
	Ns/Nc	88.452	18,6	71.428	17,9	73.678	16,2	85.564	19,3
Marihuana	Total	475.790	100,0	400.058	100,0	455.183	100,0	442.444	100,0
	Me sería fácil	276.741	58,2	225.451	56,4	221.382	48,6	138.546	31,3
	Me sería difícil	80.425	16,9	65.325	16,3	68.938	15,1	63.653	14,4
	No podría conseguir	77.461	16,3	60.034	15,0	97.457	21,4	131.371	29,7
	Ns/Nc	..	8,7	49.248	12,3	67.406	14,8	108.874	24,6
Cocaína	Total	475.790	100,0	400.058	100,0	455.183	100,0	442.444	100,0
	Me sería fácil	231.493	48,7	173.106	43,3	195.246	42,9	120.383	27,2
	Me sería difícil	104.474	22,0	97.960	24,5	82.800	18,2	74.831	16,9
	No podría conseguir	89.682	18,8	70.264	17,6	102.642	22,5	136.062	30,8
	Ns/Nc	50.141	10,5	58.728	14,7	74.495	16,4	111.168	25,1
Pasta base	Total	475.790	100,0	400.058	100,0	455.183	100,0	442.444	100,0
	Me sería fácil	135.839	28,6	115.118	28,8	126.689	27,8	86.344	19,5
	Me sería difícil	112.305	23,6	96.842	24,2	85.350	18,8	78.019	17,6
	No podría conseguir	139.726	29,4	101.816	25,5	133.382	29,3	148.086	33,5
	Ns/Nc	87.920	18,5	86.282	21,6	109.762	24,1	129.995	29,4
Éxtasis	Total	475.790	100,0	400.058	100,0	455.183	100,0	442.444	100,0
	Me sería fácil	136.286	28,6	120.803	30,2	117.701	25,9	75.943	17,2
	Me sería difícil	121.572	25,6	99.551	24,9	91.354	20,1	83.307	18,8
	No podría conseguir	128.858	27,1	95.947	24,0	133.778	29,4	149.104	33,7
	Ns/Nc	89.074	18,7	83.757	20,9	112.350	24,7	134.090	30,3

.. Estimaciones con coeficiente de variación mayor a 20%

- Valor cero

Cuadro 2.2.17: Personas de 16 a 65 años según facilidad para conseguir cada sustancia psicoactiva según aglomerado urbano

SUSTANCIA	FACILIDAD PARA CONSEGUIR	AGLOMERADO URBANO			
		Gran Rosario	Resto de los aglomerados de la provincia de Santa Fe		
			%		%
Tranquilizantes	Total	852.761	100,0	920.714	100,0
	Me sería fácil	367.243	43,1	432.135	46,9
	Me sería difícil	231.986	27,2	190.104	20,7
	No podría conseguir	175.271	20,5	121.431	13,2
	Ns/Nc	78.261	9,2	177.044	19,2
Estimulantes	Total	852.761	100,0	920.714	100,0
	Me sería fácil	326.932	38,3	307.967	33,4
	Me sería difícil	235.899	27,7	211.133	22,9
	No podría conseguir	199.745	23,4	172.677	18,8
	Ns/Nc	90.185	10,6	228.937	24,9
Marihuana	Total	852.761	100,0	920.714	100,0
	Me sería fácil	505.561	59,3	356.559	38,7
	Me sería difícil	89.181	10,5	189.160	20,5
	No podría conseguir	190.586	22,3	175.737	19,1
	Ns/Nc	67.433	7,9	199.258	21,7
Cocaína	Total	852.761	100,0	920.714	100,0
	Me sería fácil	441.932	51,8	278.296	30,2
	Me sería difícil	133.721	15,7	226.344	24,6
	No podría conseguir	198.056	23,2	200.594	21,8
	Ns/Nc	79.052	9,3	215.480	23,4
Pasta base	Total	852.761	100,0	920.714	100,0
	Me sería fácil	287.865	33,8	176.125	19,1
	Me sería difícil	149.663	17,5	222.853	24,2
	No podría conseguir	272.370	31,9	250.640	27,2
	Ns/Nc	142.863	16,8	271.096	29,5
Éxtasis	Total	852.761	100,0	920.714	100,0
	Me sería fácil	312.945	36,7	137.788	15,0
	Me sería difícil	153.560	18,0	242.224	26,3
	No podría conseguir	248.946	29,2	258.741	28,1
	Ns/Nc	137.310	16,1	281.961	30,6

.. Estimaciones con coeficiente de variación mayor a 20%

- Valor cero



3. CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

3.1 Sustancias legales o sociales

3.1.1 Prevalencia de vida

Cuadro 3.1.1.1: Prevalencia de vida de consumo de sustancias legales o sociales según ciertas características socioeconómicas, por sustancia

Características socioeconómicas		PREVALENCIA DE VIDA			
		TABACO	%	BEBIDAS ALCOHÓLICAS	%
Total		866.547	48,9	1.369.057	77,2
SEXO	Varón	444.746	53,2	724.962	86,7
	Mujer	421.801	45,0	644.095	68,7
GRUPO DE EDAD	16 a 24 años	228.636	48,1	367.373	77,2
	25 a 34 años	223.429	55,9	312.189	78,0
	35 a 49 años	214.152	47,1	357.999	78,7
	50 a 65 años	200.330	45,3	331.496	74,9
NIVEL DE INSTRUCCIÓN	Hasta primario incompleto	61.458	56,5	67.785	62,4
	Hasta secundario incompleto	399.754	51,2	586.632	75,1
	Secundario completo y más	403.770	45,8	712.363	80,8
	Educación especial	..	68,7	..	100,0
INGRESO DEL HOGAR	0 a \$1.250	265.503	51,1	358.868	69,1
	\$1.251 a \$3.000	366.868	47,7	612.567	79,6
	\$3.000 y más	143.003	49,9	256.454	89,5
	Ns/Nc	91.173	46,2	141.168	71,5
NBI TOTAL DEL HOGAR	Ningún indicador de NBI	740.496	48,1	1.188.136	77,2
	Un indicador de NBI	102.050	51,9	153.078	77,8
	Más de un indicador de NBI	..	65,5	..	76,0

.. Estimaciones con coeficiente de variación mayor a 20%
- Valor cero

3.1.2 Prevalencia del último año

Cuadro 3.1.2.1: Prevalencia del último año de consumo de sustancias legales o sociales según ciertas características socioeconómicas, por sustancia

Características socioeconómicas		PREVALENCIA DE AÑO			
		TABACO	%	BEBIDAS ALCOHÓLICAS	%
Total		630.948	35,6	1.286.410	72,5
SEXO	Varón	319.923	38,3	698.212	83,5
	Mujer	311.025	33,2	588.198	62,8
EDAD	16 a 24 años	191.561	40,3	353.756	74,4
	25 a 34 años	172.982	43,2	287.695	71,9
	35 a 49 años	140.822	30,9	330.683	72,7
	50 a 65 años	125.583	28,4	314.276	71,0
NIVEL DE INSTRUCCIÓN	Hasta primario incompleto	41.651	38,3	63.896	58,8
	Hasta secundario incompleto	314.596	40,3	548.235	70,2
	Secundario completo y más	274.701	31,2	672.714	76,3
	Educación especial	-	-	..	68,7
INGRESO DEL HOGAR	0 a \$1.250	197.077	37,9	319.563	61,5
	\$1.251 a \$3.000	272.625	35,4	585.072	76,0
	\$3.000 y más	96.811	33,8	247.798	86,5
	Ns/Nc	64.435	32,6	133.977	67,8
NBI TOTAL DEL HOGAR	Ningún indicador de NBI	531.061	34,5	1.127.392	73,2
	Un indicador de NBI	82.291	41,8	138.493	70,4
	Más de un indicador de NBI	..	48,0	..	56,0
SALUD GENERAL	Excelente, muy buena o buena	525.834	34,23	1.128.784	73,5
	Regular o Mala	105.098	44,29	157.659	66,4

.. Estimaciones con coeficiente de variación mayor a 20%

- Valor cero



3.1.3 Prevalencia del último mes

Cuadro 3.1.2.1: Prevalencia del último mes de consumo de sustancias legales o sociales según ciertas características socioeconómicas, por sustancia

Características socioeconómicas		PREVALENCIA DE MES			
		TABACO		BEBIDAS ALCOHÓLICAS	
Total		578.424	32,6 %	1.032.395	58,2 %
SEXO	Varón	299.865	35,9	608.478	72,8
	Mujer	278.559	29,7	423.917	45,2
EDAD	16 a 24 años	173.500	36,5	291.164	61,2
	25 a 34 años	152.573	38,1	223.604	55,9
	35 a 49 años	131.594	28,9	264.456	58,1
	50 a 65 años	120.757	27,3	253.171	57,2
NIVEL DE INSTRUCCIÓN	Hasta primario incompleto	41.490	38,2	51.531	47,4
	Hasta secundario incompleto	289.527	37,1	436.364	55,9
	Secundario completo y más	247.407	28,1	542.935	61,6
	Educación especial	-	-	..	68,7
INGRESO DEL HOGAR	0 a \$1.250	183.340	35,3	233.684	45,0
	\$1.251 a \$3.000	247.178	32,1	472.325	61,4
	\$3.000 y más	88.178	30,8	212.344	74,1
	Ns/Nc	59.728	30,2	114.042	57,7
NBI TOTAL DEL HOGAR	Ningún indicador de NBI	483.202	31,4	904.642	58,7
	Un indicador de NBI	77.626	39,4	114.857	58,4
	Más de un indicador de NBI	..	48,0	..	35,2
SALUD GENERAL	Excelente, Muy buena o Buena	480.016	31,3	909.070	59,2
	Regular o Mala	98.408	41,5	123.325	52,0

3.1.4 Bebidas alcohólicas

Cuadro 3.1.4.1: Población de 16 a 65 años que consumió alguna vez en su vida bebidas alcohólicas según primera vez que consumió y última vez que consumió

PERÍODO	Primera vez que consumió bebidas alcohólicas		Última vez que tomó bebidas alcohólicas	
		%		%
Total	1.369.057	100,0	1.369.057	100,0
Durante los últimos 30 días	81.780	6,0	1.032.395	75,4
Hace más de un mes, pero menos de un año	..	2,9	254.015	18,6
Hace más de un año	1.232.874	90,1	81.247	5,9
Ns/Nc	..	1,0	..	0,1

.. Estimaciones con coeficiente de variación mayor a 20%

- Valor cero

Cuadro 3.1.4.2: Población de 16 a 65 años que consumió alguna vez en el último mes bebidas alcohólicas según emborrachamiento alguna vez en los últimos 30 días

EMBORRACHAMIENTO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	Cantidad	
	Cantidad	%
Total	1.032.395	100,0
Si	145.971	14,1
No	886.424	85,9

Cuadro 3.1.4.3: Cantidad de días de consumo de cada bebida alcohólica para las personas que consumieron dicha bebida durante el último mes, por bebida

Medidas descriptivas	CANTIDAD DE DÍAS QUE TOMÓ DURANTE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS		
	CERVEZA	VINO	BEBIDAS FUERTES
Cantidad de personas que consumieron durante el último mes	646.182	642.638	161.332
	-62,60%	(62,2%)	-15,60%
Saben la cantidad de días que consumieron	624.205	627.243	133.394
No saben la cantidad de días que consumieron	21.977	15.395	27.938
Media	5,2	11,2	3,2
Mínimo	1,0	1,0	1,0
Máximo	30,0	30,0	30,0
Percentiles			
	25	2,0	3,0
	50	4,0	4,0
	75	7,0	25,0

3.1.4.1 Consumo episódico excesivo de bebidas alcohólicas

Cuadro 3.1.4.1.1: Población de 16 a 65 años que consumió alguna vez en el último mes bebidas alcohólicas según consumo episódico excesivo para cada situación

Bebida alcohólica	CONSUMO EPISÓDICO EXCESIVO				Total	
	Si	%	No	%		%
Cerveza	140.370	13,6	892.025	86,4	1.032.395	100,0
Vino	115.823	11,2	916.572	88,8	1.032.395	100,0
Bebidas fuertes	..	0,8	1.024.124	99,2	1.032.395	100,0
Bebidas alcohólicas entre semana	45.936	4,4	986.459	95,6	1.032.395	100,0
Bebidas alcohólicas en fin de semana	316.043	30,6	716.352	69,4	1.032.395	100,0
Total combinado de bebidas alcohólicas	318.725	30,9	713.670	69,1	1.032.395	100,0

.. Estimaciones con coeficiente de variación mayor a 20%

- Valor cero

3.1.4.2 Abuso de bebidas alcohólicas

Cuadro 3.1.4.2.1: Población de 16 a 65 años que consumió alguna vez en el último mes bebidas alcohólicas según abuso para cada situación

Bebida alcohólica	ABUSO				Total	
	Si	%	No	%		%
Cerveza	52.350	5,1	980.045	94,9	1.032.395	100,0
Vino	115.823	11,2	916.572	88,8	1.032.395	100,0
Bebidas fuertes	..	2,0	1.011.895	98,0	1.032.395	100,0
Bebidas alcohólicas entre semana	..	3,1	1.000.478	96,9	1.032.395	100,0
Bebidas alcohólicas en fin de semana	223.325	21,6	809.070	78,4	1.032.395	100,0
Total combinado de bebidas alcohólicas	228.111	22,1	804.284	77,9	1.032.395	100,0

3.2 Sustancias ilegales

3.2.1 Prevalencia de vida

Cuadro 3.2.1.1: Prevalencia de vida de consumo de sustancias psicoactivas ilegales, por sexo y sustancia

Sustancias psicoactivas ilegales	Total	SEXO				
		Varones		Mujeres		
		%	%	%	%	
Total	160.080	9,0	91.694	11,0	68.386	7,3
Alucinógenos	..	0,4	..	0,7	..	0,1
Cocaína	47.179	2,7	..	4,1	..	1,4
Crack	..	0,1	..	0,1	-	-
Éxtasis	..	0,6	..	1,1	..	0,1
Inhalables	..	1,1	..	1,4	..	0,8
Marihuana	140.845	7,9	77.498	9,3	63.347	6,8
Opiáceos y anestésicos	..	0,3	-	-	..	0,6
Pasta base	..	0,3	..	0,6	-	-

.. Estimaciones con coeficiente de variación mayor a 20%

- Valor cero



Cuadro 3.2.1.2: Prevalencia de vida de consumo de al menos una sustancia ilegal según ciertas características socioeconómicas

Características socioeconómicas		PREVALENCIA DE VIDA	
		SUSTANCIAS ILEGALES	
Total		160.080	9
SEXO	Varón	91.694	11
	Mujer	68.386	7,3
EDAD	16 a 24 años	64.910	13,6
	25 a 34 años	60.613	15,2
	35 a 49 años	..	5,4
	50 a 65 años	..	2,3
NIVEL DE INSTRUCCIÓN	Hasta primario incompleto	4.475	4,1
	Hasta secundario incompleto	55.844	7,2
	Secundario completo y más	99.761	11,3
	Educación especial	-	-
INGRESO DEL HOGAR	0 a \$1.250	..	6,9
	\$1.251 a \$3.000	79.195	10,3
	\$3.000 y más	..	11,8
	Ns/Nc	..	5,8
NBI TOTAL DEL HOGAR	Ningún indicador de NBI	134.364	8,7
	Un indicador de NBI	..	9,7
	Más de un indicador de NBI	..	18

3.2.2 Prevalencia del último año

Cuadro 3.2.2.1: Prevalencia del último año de consumo de sustancias psicoactivas ilegales, por sexo y sustancia

Sustancias psicoactivas ilegales	Total	SEXO				
		Varones		Mujeres		
		%	%	%	%	
Total	50.212	2,8	..	4,4	..	1,5
Alucinógenos	..	0,2	..	0,3	-	-
Cocaína	..	1	..	1,7	..	0,3
Crack	..	0,1	..	0,1	-	-
Éxtasis	..	0,1	..	0,1	-	-
Marihuana	41.406	2,3	..	3,3	..	1,5

Nota: No hubo personas que hayan consumido *inhalables*, *opiáceos* y *anestésicos*, y *pasta base*, alguna vez en el último año

.. Estimaciones con coeficiente de variación mayor a 20%
- Valor cero

Cuadro 3.2.2.2: Prevalencia de año de consumo de al menos una sustancia ilegal según ciertas características socioeconómicas

Características socioeconómicas		PREVALENCIA DE AÑO SUSTANCIAS ILEGALES	
			%
Total		50.212	2,8
SEXO	Varón	..	4,4
	Mujer	..	1,5
GRUPO DE EDAD	16 a 24 años	..	4,1
	25 a 34 años	..	5,9
	35 a 49 años	..	0,8
	50 a 65 años	..	0,7
NIVEL DE INSTRUCCIÓN	Hasta primario incompleto	..	2,7
	Hasta secundario incompleto	..	2,1
	Secundario completo y más	..	3,5
	Educación especial	-	-
INGRESO DEL HOGAR	0 a \$1.250	..	2,7
	\$1.251 a \$3.000	..	2,4
	\$3.000 y más	..	5,8
	Ns/Nc	..	0,4
NBI TOTAL DEL HOGAR	Ningún indicador de NBI	43.811	2,8
	Un indicador de NBI	..	3,3
	Más de un indicador de NBI	-	-
SALUD GENERAL	Excelente, Muy buena o Buena	..	2,6
	Regular o Mala	..	4,6

3.2.3 Prevalencia del último mes

Cuadro 3.2.3.1: Prevalencia del último mes de consumo de sustancias psicoactivas ilegales, por sexo y sustancia

Sustancias psicoactivas ilegales	Total	SEXO				
		Varones		Mujeres		
		%	%	%	%	
Total	35.853	2,0	..	3,5	..	0,7
Alucinógenos	..	0,1	..	0,2	-	-
Cocaína	..	0,9	..	1,5	..	0,3
Éxtasis	..	0,1	..	0,1	-	-
Marihuana	..	1,4	..	2,5	..	0,4

Nota: No hubo personas que hayan consumido crack, inhalables, opiáceos y anestésicos, y pasta base, alguna vez en el último mes

.. Estimaciones con coeficiente de variación mayor a 20%
- Valor cero

Cuadro 3.2.3.2: Prevalencia del último mes de consumo de al menos una sustancia ilegal según ciertas características socioeconómicas

Características socioeconómicas		PREVALENCIA DE MES SUSTANCIAS ILEGALES	
			%
Total		35.853	2
SEXO	Varón	..	3,5
	Mujer	..	0,7
GRUPO DE EDAD	16 a 24 años	..	3,1
	25 a 34 años	..	3,7
	35 a 49 años	..	0,7
	50 a 65 años	..	0,7
NIVEL DE INSTRUCCIÓN	Hasta primario incompleto	..	2,7
	Hasta secundario incompleto	..	1,8
	Secundario completo y más	..	2,1
	Educación especial	-	-
INGRESO DEL HOGAR	0 a \$1.250	..	2,4
	\$1.251 a \$3.000	..	1,8
	\$3.000 y más	..	3,2
	Ns/Nc	-	-
NBI TOTAL DEL HOGAR	Ningún indicador de NBI	..	1,9
	Un indicador de NBI	..	3,3
	Más de un indicador de NBI	-	-
SALUD GENERAL	Excelente, Muy buena, Buena	..	1,6
	Regular o Mala	..	4,6

3.2.4 Dependencia de ciertas sustancias ilegales

Cuadro 3.2.4.1: Población de 16 a 65 años que consumió alguna vez en el último año sustancias psicoactivas según dependencia de consumo, por sustancia

Sustancia	DEPENDENCIA DE CONSUMO				Total
	Si		No		
	..	%	..	%	%
Marihuana	..	22,2	..	77,8	41.406
Cocaína	..	76	..	24	100
Éxtasis	..	100	-	-	100
Pasta base	-	-	..	100	100

.. Estimaciones con coeficiente de variación mayor a 20%

- Valor cero

Acontecimientos considerados en la definición de dependencia de consumo de ciertas sustancias ilegales:

1. tolerancia, definida por cualquiera de los siguientes ítems:
 - a. una necesidad de cantidades marcadamente crecientes de la sustancia para conseguir la intoxicación o el efecto deseado;
 - b. el efecto de las mismas cantidades de sustancia disminuye claramente con su consumo continuado.
2. abstinencia, definida por cualquiera de los siguientes ítems:
 - a. el síndrome de abstinencia característico para la sustancia (criterios diagnósticos para la abstinencia de sustancias específicas: Presencia de un síndrome específico de una sustancia debido al cese o reducción de su consumo prolongado y en grandes cantidades y un malestar clínicamente significativo o un deterioro de la actividad laboral y social o en otras áreas importantes de la actividad del individuo);
 - b. se toma la misma sustancia (o una muy parecida) para aliviar o evitar los síntomas de abstinencia.
3. la sustancia es tomada con frecuencia en cantidades mayores o durante un período más largo de lo que inicialmente se pretendía.
4. existe un deseo persistente o esfuerzos infructuosos de controlar o interrumpir el consumo de la sustancia.
5. se emplea mucho tiempo en actividades relacionadas con la obtención de la sustancia (p. ej., visitar a varios médicos o desplazarse largas distancias), en el consumo de la sustancia (p. ej., fumar un pitillo tras otro) o en la recuperación de los efectos de la sustancia.
6. reducción de importantes actividades sociales, laborales o recreativas debido al consumo de la sustancia.
7. se continúa tomando la sustancia a pesar de tener conciencia de problemas psicológicos o físicos recidivantes o persistentes, que parecen causados o exacerbados por el consumo de la sustancia (p. ej., consumo de la cocaína a pesar de saber que provoca depresión, o continuada ingesta de alcohol a pesar de que empeora una úlcera).

3.3 Fármacos

3.3.1 Prevalencia de vida

Cuadro 3.3.1.1: Prevalencia de vida de consumo de fármacos, por sexo y sustancia

Fármacos	Total	SEXO				
		Varones		Mujeres		
		%		%		%
Total	144.299	8,1	44.991	5,4	99.308	10,6
Estimulantes	..	0,7	..	0,8	..	0,6
Medicamentos para adelgazar	75.324	4,3	..	1,7	61.487	6,6
Tranquilizantes	72.162	4,1	..	3,8	..	4,3

.. Estimaciones con coeficiente de variación mayor a 20%

- Valor cero

Cuadro 3.3.1.2: Prevalencia de vida de consumo de al menos un fármaco según ciertas características socioeconómicas

Características socioeconómicas		PREVALENCIA DE VIDA	
		FÁRMACOS	
	Total	144.299	8,1
SEXO	Varón	44.991	5,4
	Mujer	99.308	10,6
GRUPO DE EDAD	16 a 24 años	..	4,2
	25 a 34 años	43.477	10,9
	35 a 49 años	43.469	9,6
	50 a 65 años	..	8,4
NIVEL DE INSTRUCCIÓN	Hasta primario incompleto	..	6,1
	Hasta secundario incompleto	45.020	5,8
	Secundario completo y más	92.698	10,5
	Educación especial	-	-
INGRESO DEL HOGAR	0 a \$1.250	..	7,2
	\$1.251 a \$3.000	70.687	9,2
	\$3.000 y más	..	10,7
	Ns/Nc	..	3,0
NBI TOTAL DEL HOGAR	Ningún indicador de NBI	139.043	9,0
	Un indicador de NBI	..	2,6
	Más de un indicador de NBI	..	0,5

3.3.2 Prevalencia del último año

Cuadro 3.3.2.1: Prevalencia del último año de consumo de fármacos, por sexo y sustancia

Fármacos	Total	SEXO			
		Varones		Mujeres	
		%	%	%	%
Total	63.559	3,6	2,7	4,4	4,4
Estimulantes	..	0,3	0,6	-	-
Medicamentos para adelgazar	..	1,6	0,2	..	2,9
Tranquilizantes	34.412	1,9	2,5	..	1,5

.. Estimaciones con coeficiente de variación mayor a 20%

- Valor cero

Cuadro 3.3.1.2: Prevalencia del último año de consumo de al menos un fármaco según ciertas características socioeconómicas

Características socioeconómicas		PREVALENCIA DE AÑO	
		FÁRMACOS	
Total		63.559	3,6
			%
SEXO	Varón	..	2,7
	Mujer	..	4,4
GRUPO DE EDAD	16 a 24 años	..	2,4
	25 a 34 años	..	5,3
	35 a 49 años	..	4,6
	50 a 65 años	..	2,2
NIVEL DE INSTRUCCIÓN	Hasta primario incompleto	..	1,4
	Hasta secundario incompleto	..	3,2
	Secundario completo y más	..	4,2
	Educación especial	-	-
INGRESO DEL HOGAR	0 a \$1.250	..	3,9
	\$1.251 a \$3.000	..	4,0
	\$3.000 y más	..	3,9
	Ns/Nc	..	0,6
NBI TOTAL DEL HOGAR	Ningún indicador de NBI	61.966	4,0
	Un indicador de NBI	..	0,8
	Más de un indicador de NBI	-	-
SALUD GENERAL	Excelente, Muy buena o Buena	52.691	3,4
	Regular o Mala	..	4,6

3.3.3 Prevalencia del último mes

Cuadro 3.3.3.1: Prevalencia del último mes de consumo de fármacos, por sexo y sustancia

Fármacos	Total	SEXO		
		Varones	Mujeres	
				%
Total	..	1,8	..	1,4
Estimulantes	..	0,3	..	0,6
Medicamentos para adelgazar	..	0,9	..	0,2
Tranquilizantes	..	0,9	..	1,2
				%
				2,2
				-
				1,6
				0,7

.. Estimaciones con coeficiente de variación mayor a 20%

- Valor cero

Cuadro 3.3.3.2: Prevalencia del último mes de consumo de al menos un fármaco según ciertas características socioeconómicas

Características socioeconómicas		PREVALENCIA DE MES FÁRMACOS	
			%
	Total	..	1,8
SEXO	Varón	..	1,4
	Mujer	..	2,2
GRUPO DE EDAD	16 a 24 años	..	1,3
	25 a 34 años	..	2,2
	35 a 49 años	..	2,6
	50 a 65 años	..	1,3
NIVEL DE INSTRUCCIÓN	Hasta primario incompleto	..	0,4
	Hasta secundario incompleto	..	2,0
	Secundario completo y más	..	1,9
	Educación especial	-	-
INGRESO DEL HOGAR	0 a \$1.250	..	2,9
	\$1.251 a \$3.000	..	2,0
	\$3.000 y más	..	0,8
	Ns/Nc	-	-
NBI TOTAL DEL HOGAR	Ningún indicador de NBI	..	2,1
	Un indicador de NBI	..	0,3
	Más de un indicador de NBI	-	-
SALUD GENERAL	Excelente, Muy buena o Buena	..	1,4
	Regular o Mala	..	4,4

.. Estimaciones con coeficiente de variación mayor a 20%

- Valor cero



3.4 Edad de inicio de consumo de las sustancias psicoactivas

Cuadro 3.4.1: Edad mínima, máxima, y promedio en la que probó por primera vez una sustancia psicoactiva de las personas de 16 a 65 años que consumieron cada sustancia psicoactiva

Sustancia	EDAD DE INICIO DE CONSUMO		
	Mínimo	Media**	Máximo
	Años		
Tabaco	8	16,6	42
Bebidas alcohólicas	5	17,2	59
Marihuana	6	19,3	55
Cocaína	15	21,0	45
Medicamentos para adelgazar	15	27,2	55
Tranquilizantes	14	28,6	54
Inhalables*	8	16,7	25
Alucinógenos*	17	19,2	22
Estimulantes*	13	20,0	40
Éxtasis*	13	20,4	38
Pasta base*	20	21,9	30
Otras drogas*	9	22,8	30
Crack*	25	25,0	25
Opiáceos y anestésicos*	22	36,7	55

Nota: * Sustancias cuyo cv de la prevalencia de vida es mayor a 20%

** Las sustancias están ordenadas de menor a mayor edad de inicio promedio de consumo.

4. DEMANDA DE TRATAMIENTO

Cuadro 4.1: Población de 16 a 65 años que consumió alguna vez en su vida alguna de las sustancias psicoactivas, según hayan buscado ayuda profesional para tratar de disminuir el consumo de las mismas

AYUDA PROFESIONAL PARA TRATAR DE DISMINUIR EL CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO U OTRAS DROGAS	Cantidad	%
	Total	1.521.202
Sí	42.170	2,8
No	1.476.324	97,0
Ns/Nc	..	0,2

Cuadro 4.2: Población de 16 a 65 años de edad que consumió alguna vez en el último año sustancias psicoactivas, según dependencia de las mismas y según buscó ayuda profesional para tratar de disminuir el consumo de las mismas, por sustancia

AYUDA PROFESIONAL	DEPENDENCIA SEGÚN SUSTANCIA							
	Marihuana			Cocaína				
	Si	No	%	Si	No	%		
Total	..	100,0	..	100,0	..	100,0	..	100,0
Sí	..	48,2	..	13,3	..	18,2	..	12,0
No	..	51,8	..	86,7	..	81,8	..	88,0

.. Estimaciones con coeficiente de variación mayor a 20%

- Valor cero

Cuadro 4.3: Población de 16 a 65 años que consumió bebidas alcohólicas alguna vez en el último mes, según abusos de las mismas y según buscó ayuda profesional para tratar de disminuir el consumo de alcohol, tabaco u otras drogas, por tipo de abuso

AYUDA PROFESIONAL	ABUSO SEGÚN TIPO							
	Bebidas alcohólicas en fin de semana				Total combinado de bebidas alcohólicas			
	Si		No		Si		No	
		%		%		%		%
Total	223.325	100,0	809.070	100,0	228.111	100,0	804.284	100,0
Sí	..	2,9	..	3,6	..	2,8	..	3,6
No	216.903	97,1	778.824	96,3	221.689	97,2	774.038	96,2
Ns/Nr	-	-	..	0,2	-	-	..	0,2

Cuadro 4.4: Población de 16 a 65 años que consumió bebidas alcohólicas alguna vez en el último mes, según consumo episódico excesivo de las mismas y según buscó ayuda profesional para tratar de disminuir el consumo de alcohol, tabaco u otras drogas, por tipo de consumo episódico excesivo

AYUDA PROFESIONAL	CONSUMO EPISÓDICO EXCESIVO SEGÚN TIPO							
	Bebidas alcohólicas en fin de semana				Total combinado de bebidas alcohólicas			
	Si		No		Si		No	
		%		%		%		%
Total	316.043	100,0	716.352	100,0	318.725	100,0	713.670	100,0
Sí	..	3,0	..	3,6	..	3,0	..	3,6
No	306.507	97,0	689.220	96,2	309.189	97,0	686.538	96,2
Ns/Nr	-	-	..	0,2	-	-	..	0,2

Cuadro 4.5: Población de 16 a 65 años que consumió alguna vez en su vida alguna de las sustancias psicoactivas y buscó ayuda profesional para tratar de disminuir el consumo de las mismas, según asistencia a ciertos lugares

LUGAR DE ASISTENCIA	BÚSQUEDA DE ASISTENCIA POR CONSUMO DE SUSTANCIAS				Total	
	Si		No			
		%		%		%
Consultorios externos	..	35,4	27.250	64,6	42.170	100,0
Grupos de autoayuda para problemas de tabaquismo	..	20,7	33.449	79,3	42.170	100,0
Hospitales generales	..	20,4	33.584	79,6	42.170	100,0
Iglesias o grupos religiosos	..	19,3	34.048	80,7	42.170	100,0
Otro lugar	..	14,7	35.992	85,3	42.170	100,0
Clínicas psiquiátricas	..	13,8	36.351	86,2	42.170	100,0
Centros de salud mental	..	10,9	37.557	89,1	42.170	100,0
Servicios gratuitos de líneas telefónicas	..	5,7	39.783	94,3	42.170	100,0
Comunidades terapéuticas	..	5,5	39.855	94,5	42.170	100,0
Alcohólicos Anónimos	..	3,9	40.542	96,1	42.170	100,0
Centros de desintoxicación	..	1,7	41.436	98,3	42.170	100,0
Narcóticos Anónimos	-	-	42.170	100,0	42.170	100,0
Centros de alcoholismo	-	-	42.170	100,0	42.170	100,0

.. Estimaciones con coeficiente de variación mayor a 20%

- Valor cero

Cuadro 4.6: Población de 16 a 65 años que consumió alguna vez en su vida alguna de las sustancias psicoactivas y buscó ayuda profesional para tratar de disminuir el consumo de alcohol, tabaco u otras drogas, según está o estuvo en tratamiento por consumo de sustancias

TRATAMIENTO POR CONSUMO DE SUSTANCIAS	Cantidad	%
Total	42.170	100,0
Sí, está actualmente	..	6,1
Sí, estuvo alguna vez	..	38,4
Nunca estuvo	23.393	55,5

Cuadro 4.7: Población de 16 a 65 años que buscó ayuda profesional y consumió ciertas sustancias ilegales alguna vez en el último mes, según dependencia de las mismas y según tratamiento por consumo de sustancias, por sustancia

¿ESTÁ O ESTUVO EN TRATAMIENTO POR CONSUMO DE SUSTANCIAS?	DEPENDENCIA SEGÚN SUSTANCIA							
	Marihuana			Cocaína				
	Si	No	%	Si	No	%		
Total	..	100,0	..	100,0	..	100,0	..	100,0
Sí, está actualmente	-	-	-	-	..	33,9	-	-
Sí, estuvo alguna vez	-	-	..	52,0	-	-	-	-
Nunca estuvo	..	100,0	..	48,0	..	66,1	..	100,0

Cuadro 4.8: Población de 16 a 65 años que buscó ayuda profesional y consumió bebidas alcohólicas alguna vez en el último mes, según abuso de las mismas y según tratamiento por consumo de sustancias, por tipo de abuso

¿ESTÁ O ESTUVO EN TRATAMIENTO POR CONSUMO DE SUSTANCIAS?	ABUSO SEGÚN TIPO							
	Bebidas alcohólicas en fin de semana			Total combinado de bebidas alcohólicas				
	Si	No	%	Si	No	%		
Total	..	100,0	..	100,0	..	100,0	..	100,0
Sí, estuvo alguna vez	..	7,0	..	48,4	..	7,0	..	48,4
Nunca estuvo	..	93,0	..	51,6	..	93,0	..	51,6

Cuadro 4.9: Población de 16 a 65 años que buscó ayuda profesional y consumió bebidas alcohólicas alguna vez en el último mes, según consumo episódico excesivo de las mismas y según tratamiento por consumo de sustancias, por tipo de consumo

¿ESTÁ O ESTUVO EN TRATAMIENTO POR CONSUMO DE SUSTANCIAS?	Consumo episódico excesivo según tipo							
	Bebidas alcohólicas en fin de semana			Total combinado de bebidas alcohólicas				
	Si	No	%	Si	No	%		
Total	..	100,0	..	100,0	..	100,0	..	100,0
Sí, estuvo alguna vez	..	28,0	..	45,6	..	28,0	..	45,6
Nunca estuvo	..	72,0	..	54,4	..	72,0	..	54,4

.. Estimaciones con coeficiente de variación mayor a 20%

- Valor cero



5. OPINIÓN SOBRE EL RIESGO DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

Cuadro 5.1: Población de 16 a 65 años según opinión sobre el riesgo que corre una persona que toma bebidas alcohólicas, por tipo de frecuencia

OPINIÓN	Consumo de bebidas alcohólicas			
	De vez en cuando		Frecuentemente	
		%		%
Total	1.773.475	100,0	1.773.475	100,0
Ningún riesgo	420.204	23,7	..	0,9
Riesgo leve o moderado	847.654	47,8	185.496	10,5
Gran riesgo	452.892	25,5	1.529.364	86,2
No sabe que riesgo corre	52.725	3,0	43.018	2,4

Cuadro 5.2: Población de 16 a 65 años según opinión sobre el riesgo que corre una persona que fuma cigarrillos, por tipo de frecuencia

OPINIÓN	Consumo de cigarrillos			
	De vez en cuando		Frecuentemente	
		%		%
Total	1.773.475	100,0	1.773.475	100,0
Ningún riesgo	117.085	6,6	..	0,5
Riesgo leve o moderado	806.518	45,5	99.237	5,6
Gran riesgo	799.410	45,1	1.625.271	91,6
No sabe que riesgo corre	50.462	2,8	39.992	2,3

Cuadro 5.3: Población de 16 a 65 años de edad según opinión sobre el riesgo que corre una persona que consume marihuana, por tipo de frecuencia

OPINIÓN	Consumo de marihuana			
	De vez en cuando		Frecuentemente	
		%		%
Total	1.773.475	100,0	1.773.475	100,0
Ningún riesgo	87.823	5,0	..	0,9
Riesgo leve o moderado	454.322	25,6	122.705	6,9
Gran riesgo	1.081.648	61,0	1.497.822	84,5
No sabe que riesgo corre	149.682	8,4	137.645	7,8

Cuadro 5.4: Población de 16 a 65 años según opinión sobre el riesgo que corre una persona que consume cocaína, por tipo de frecuencia

OPINIÓN	Consumo de cocaína			
	De vez en cuando		Frecuentemente	
		%		%
Total	1.773.475	100,0	1.773.475	100,0
Ningún riesgo	..	1,3	-	-
Riesgo leve o moderado	251.290	14,2	..	0,9
Gran riesgo	1.386.850	78,2	1.665.662	93,9
No sabe que riesgo corre	111.405	6,3	91.706	5,2

.. Estimaciones con coeficiente de variación mayor a 20%

- Valor cero



Cuadro 5.5: Población de 16 a 65 años según opinión sobre el riesgo que corre una persona que consume pasta base, por tipo de frecuencia

OPINIÓN	Consumo de pasta base			
	De vez en cuando		Frecuentemente	
		%		%
Total	1.773.475	100,0	1.773.475	100,0
Ningún riesgo	..	0,2	-	-
Riesgo leve o moderado	129.670	7,3	..	0,4
Gran riesgo	1.425.530	80,4	1.559.029	87,9
No sabe que riesgo corre	215.472	12,1	207.828	11,7

Cuadro 5.6: Población de 16 a 65 años según opinión sobre el riesgo que corre una persona que consume éxtasis, por tipo de frecuencia

OPINIÓN	Consumo de éxtasis			
	De vez en cuando		Frecuentemente	
		%		%
Total	1.773.475	100,0	1.773.475	100,0
Ningún riesgo	..	0,6	-	-
Riesgo leve o moderado	175.944	9,9	..	0,8
Gran riesgo	1.303.467	73,5	1.491.389	84,1
No sabe que riesgo corre	283.462	16,0	268.411	15,1

Cuadro 5.7: Población de 16 a 65 años según opinión sobre el riesgo que corre una persona que consume tranquilizantes sin indicación médica, por tipo de frecuencia

OPINIÓN	Consumo de tranquilizantes			
	De vez en cuando		Frecuentemente	
		%		%
Total	1.773.475	100,0	1.773.475	100,0
Ningún riesgo	141.131	8,0	..	0,9
Riesgo leve o moderado	655.656	37,0	122.564	6,9
Gran riesgo	721.774	40,7	1.411.861	79,6
No sabe que riesgo corre	254.914	14,4	222.883	12,6

Cuadro 5.8: Población de 16 a 65 años según opinión sobre el riesgo que corre una persona que consume estimulantes sin indicación médica, por tipo de frecuencia

OPINIÓN	Consumo de estimulantes			
	De vez en cuando		Frecuentemente	
		%		%
Total	1.773.475	100,0	1.773.475	100,0
Ningún riesgo	60.959	3,4	..	0,3
Riesgo leve o moderado	487.714	27,5	81.661	4,6
Gran riesgo	896.205	50,5	1.377.969	77,7
No sabe que riesgo corre	328.597	18,5	308.780	17,4

.. Estimaciones con coeficiente de variación mayor a 20%

- Valor cero

