



Gobierno de Santa Fe

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE BIOQUÍMICA, FARMACIA Y DROGUERÍA CENTRAL

Santa Fe, 25 de septiembre de 2014

PROGRAMA PROVINCIAL DE FARMACOVIGILANCIA

BOLETÍN INFORMATIVO: Nº 12/2014

ACTUALIZACIÓN EN FIEBRE CHIKUNGUYA (CHIK)

Ante la aparición de casos autóctonos de Fiebre Chikungunya (CHIK) en el Norte de Brasil, la notificación creciente de casos importados en Argentina y el aumento de la temperatura estacional, se **debe fortalecer la sospecha, notificación, investigación y control oportunos de casos sospechosos.**

La fiebre Chikungunya, junto con el dengue, la fiebre amarilla y la encefalitis de San Luis, constituyen un grupo de enfermedades causadas por virus transmitidos por artrópodos (alphavirus). Comparten: mecanismo de transmisión, las acciones de control, características clínicas y red de diagnóstico por laboratorio en Argentina, por lo que se realiza su vigilancia integrada.

¿Cómo se transmite?

Esta infección se transmite a través de la picadura de mosquitos de las especies *Aedes aegypti* y *Aedes albopictus* que se infectan luego de haber picado a una persona que padece la enfermedad. También las mujeres embarazadas que se enferman en el período próximo al parto pueden transmitir la infección al bebé en el momento del nacimiento. No se transmite de persona a persona, tampoco a través de objetos

¿Cuáles son los síntomas?

Los síntomas comienzan a manifestarse por lo general de 3 a 7 días después de la picadura de un mosquito infectado. Se trata de fiebre (mayor a 38° C), dolor intenso e inflamación en las articulaciones, a menudo en las manos y los pies. También puede aparecer dolor de cabeza, dolor muscular o sarpullido.

¿Existe tratamiento?

Si bien no existen medicamentos específicos para tratarla, sí se prescriben fármacos para reducir la fiebre y el dolor. **Ante la presencia de síntomas no tomar aspirinas ni otros antiinflamatorios; no se automedique.**

Concurra a su centro de salud para recibir el diagnóstico y tratamiento adecuado

Si bien la mayoría de los pacientes con fiebre chikungunya se mejoran en una semana, el dolor articular puede persistir por más tiempo en algunos casos.



Gobierno de Santa Fe

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE BIOQUÍMICA, FARMACIA Y DROGUERÍA CENTRAL

Santa Fe, 25 de septiembre de 2014

Las personas con mayor riesgo de tener formas graves de la enfermedad son los recién nacidos expuestos al virus durante el parto, las personas mayores de 65 años y aquellas con afecciones como presión arterial alta, diabetes o enfermedad cardíaca.

¿Cómo se puede prevenir?

No existen vacunas o medicamentos que prevengan la infección por el virus Chikungunya. Las medidas de prevención se destinan a **disminuir la proliferación de mosquitos**:

- Eliminar todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua (como latas, botellas, neumáticos).
- Dar vuelta los objetos que se encuentran en el exterior y pueden acumular agua cuando llueve (baldes, palanganas, tambores).
- Cambiar diariamente el agua de bebederos de animales, colectores de desagües de aire acondicionado o lluvia, dentro y fuera de la casa, cada 3 días. Si fuera posible, utilice en los floreros productos alternativos en lugar de agua (geles o arena húmeda).
- Mantener los patios y jardines desmalezados y destapar los desagües de lluvia de los techos.
- Tapar los tanques y recipientes que se usan para recolectar agua.

Y para evitar la exposición a los mosquitos se recomienda el uso de ropas de mangas largas, repelentes y mosquiteros.

Es recomendable que las mujeres embarazadas adopten especialmente estas precauciones para evitar el contacto con los mosquitos vectores.

Además, para prevenir que otros mosquitos se infecten y puedan contagiar a otras personas es muy importante que las personas enfermas con Chikungunya utilicen mosquiteros en los sitios en que se encuentran mientras tengan fiebre hasta que termine el período febril.

Definiciones y clasificaciones de caso de FIEBRE POR VIRUS CHIKUNGUNYA:

CASO SOSPECHOSO: Todo paciente con inicio agudo de fiebre mayor a 38.5°C y artralgias graves discapacitantes o artritis no explicada por otra condición médica y que reside o ha visitado áreas endémicas o con transmisión confirmada del virus dentro de las dos (2) semanas previas al inicio de síntomas.

CASO PROBABLE: Todo paciente que cumpla con los criterios de caso sospechoso y presente IgM positiva en muestra de suero o tejidos obtenida en fase aguda o convaleciente.

CASO CONFIRMADO: Todo paciente que cumpla con los criterios de caso sospechoso o probable y se obtenga:

- Aislamiento viral y/o detección molecular del genoma viral en muestra (suero o tejido) obtenida dentro de los ocho (8) días de evolución desde el inicio de la fiebre, o,



Gobierno de Santa Fe

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE BIOQUÍMICA, FARMACIA Y DROGUERÍA CENTRAL

Santa Fe, 25 de septiembre de 2014

- Prueba de Neutralización de anticuerpos IgG positiva en sueros pareados

RECOMENDACIONES A LAS ÁREAS DE CONTROL VECTORIAL: Aumentar los esfuerzos para reducir la densidad del vector, basados en la Estrategia de Gestión Integrada de Dengue (EGI-Dengue).

Por esta situación se ha elaborado un Plan Nacional de contingencia denominado:

“Plan Nacional de Preparación y Respuesta frente a la fiebre Chikungunya”

Que tiene por **objetivo general:** minimizar los efectos de la posible de introducción del virus *chikungunya* en Argentina y disminuir el riesgo de propagación de brotes y prevenir la endemidad.

Las **estrategias de intervención** del plan se basan en 5 ejes determinantes:

1. Coordinación general e intersectorial
2. Vigilancia epidemiológica
3. Atención al paciente
4. Respuesta a la emergencia: Planificación de los servicios de salud
5. Comunicación social y participación comunitaria

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD

Departamento de Epidemiología
email: epidemiologiazonasur@yahoo.com.ar
vigilanciasantafe@yahoo.com.ar

DIRECCIÓN DE BIOQUÍMICA, FARMACIA Y DROGUERÍA CENTRAL

PROGRAMA PROVINCIAL DE FARMACOVIGILANCIA
farmacovigilancia_dbyfcia@santafe.gov.ar

Bv. Gálvez 1563 CP:S3000AAG - Santa Fe
Te: (0342) 4573710/3713/1930

Fuentes:

- **Información sobre fiebre Chikungunya.** Disponible en portal del Ministerio Salud de la Nación <http://www.msal.gov.ar/index.php/component/content/article/47-epidemiologia/449-informacion-sobre-fiebre-chikungunya>
- **Plan nacional de preparación y respuesta frente a la fiebre Chikungunya en Argentina 2004.** Disponible en portal del Ministerio Salud de la Nación: http://www.msal.gov.ar/images/stories/bes/graficos/0000000526cnt-Chikungunya_Plan_Nacional_Preparacion.pdf
- **Actualización fiebre Chikungunya y necesidad de fortalecer las acciones de vigilancia, prevención y control.** Disponible en portal del Ministerio Salud de la Nación: <http://www.msal.gov.ar/images/stories/epidemiologia/chikungunya/pdf/22-09-2014-actualizacion-situacion-chikungunia.pdf>

Dirección de Bioquímica, Farmacia y Droguería Central

Programa Provincial de Farmacovigilancia
farmacovigilancia_dbyfcia@santafe.gov.ar

Bv. Gálvez 1563 CP:S3000AAG - Santa Fe
Te:(0342)4573710/3713/1930