

Vacunación contra la Fiebre Hemorrágica Argentina

La vacuna *CANDID #1* es altamente eficaz y se encuentra en el Calendario de Vacunas indicada a personas que residan en **zona endémica**.

Se requiere UNA **DOSIS ÚNICA** para estar protegido.

Condiciones que deben reunir las personas que deben vacunarse:

- Residir o desarrollar actividades en las provincias/localidades donde se han presentado casos de FHA (zona endémica).
- Hombres y mujeres a partir de los 15 años de edad y hasta los 65 años inclusive.
- No haber recibido la vacuna anteriormente.
- En caso de mujeres, **no deben estar embarazadas o amamantando**.
- No presentar **cuadro febril agudo**.
- No estar recibiendo **corticoides en altas dosis**.
- No ser paciente **inmunocomprometido** (trasplantados, quimio, radioterapia, etc).
- **No haber recibido otras vacunas en el mes previo, ni recibirlas en el mes posterior; tampoco el mismo día.**

Los frascos de vacuna liofilizada tienen autorización para conservarse a entre **-15°C y 20°C** (freezer) hasta su fecha de vencimiento.

Conservación de las ampollas de agua estéril para inyectables

En los efectores las ampollas deberán ser conservadas en heladera entre +2°C y +8°C **durante 30 días**.

Resuspensión de la vacuna liofilizada

- Los frascos de vacuna serán resuspendidos en el momento de utilizarse.
- No se debe pasar alcohol u otro desinfectante sobre el tapón de goma de los frascos de vacuna, ya que este procedimiento puede inactivar el virus de la vacuna.
- Con una jeringa de 10 ml y una aguja 20Gx1 estériles descartables, agregar

"AÑO 2025- 210 años del Congreso de los Pueblos Libres"

lentamente 5,5 ml de agua estéril para inyectables evitando formar espuma.

- Descartar la jeringa y la aguja utilizadas.
- No agitar ni sacudir el frasco.
- Rotarlo suavemente y colocarlo en la heladera (no en el congelador).
- No utilizar el frasco hasta que el material liofilizado se haya disuelto por completo.
- La disolución es adecuada cuando el líquido se ve absolutamente transparente y sin partículas en suspensión.

Conservación de la vacuna resuspendida

La vacuna resuspendida debe ser conservada en la heladera a una temperatura entre **+2°C y +8°C** (NO en el congelador) y deberá utilizarse **dentro de las 12 horas** de su reconstitución.

Dosis y vía de administración

- Dosis: Se aplica en una dosis única de **0,5 ml** de producto reconstituido.
- Vía de administración: **intramuscular**. Sitio de aplicación: **músculo deltoides**.