

Aves

Fuente: **Guía para la Identificación de las Aves de Argentina y Uruguay**

Orden Anseriformes:

Familia ANATIDAE:

Patos, cisnes, gansos, cauquenes, "avutardas" - Cosmopolita - 144 especies, 38 en Argentina - Acuáticos - Buenos nadadores y voladores - Zambullen - Caminan - Gregarios - Vuelo rápido y batido - Muchos huevos blancuzcos - Espejo alar brillante - Pico ancho, chato, con uña apical - Patas cortas - 3 dedos palmeados.

En algunos, ♂ y ♀ distintos.

CISNE CUELLO NEGRO

Cygnus melancoryphus



80 cm - Inconfundible - Cabeza y largo cuello negros - Resto blanco - Carúncula roja.

Jóvenes: Cabeza y cuello gris parduzcos - Resto manchado de parduzco.

Ambientes acuáticos y costas de mar - En invierno más al N.

CRESTÓN MACHO Y HEMBRA

Netta peposaca



43 cm. - Grandes bandadas - Robusto Negro con brillo - Notable banda alar, subcaudal y ala ventral blancos Flancos cenicientos - Pico rosado - Carúncula e iris rojizos - Dorso más oscuro - Periocular y

garganta blancuzcos - Pico negruzco - Ambientes acuáticos.

COSCOROBA

Coscoroba coscoroba




65 cm - Gregario - Esbelto - Aspecto de cisne - Tompeteos pipkoró y kokkoró - Blanco - Negro en primarias visible en vuelo - Pico rojo - Patas rosáceas.

Jóvenes: Manchado de pardo.

Ambientes acuáticos.

PATITO DE COLLAR O DE LUNARES

Callonetta leucophrys



28 cm. - Posa en árboles - Vistoso - Cabeza y cuello blancuzcos - Faja negra en corona y cuello dorsal - Escapulares rufas - Mancha circular blanca en alas, notable en vuelo - Pecho rosáceo con pecas negras -

Fino barrado en flancos

♀ Más parda - Ceja y manchas en cabeza y cuello, blancas - Flancos con leve barra do pardo - Esteros, sabanas inundadas y lagunas.

PATO BARCINO

Anas flavirostris

33 cm - Nido en árboles - Cuello y cola más cortos - Frente más alta y leve semicopete (menos conspicuos en hembras)

Cabeza y cuello oscuros Espejo negro entre fajas canelas - Flancos uniformes - Raza del NO: 37 cm. - Neto contraste entre dorsal oscuro y ventral blancuzco.

Ambientes acuáticos.



dorsal oscuro y ventral


PATO CABEZA NEGRA

Heteronetta atricapilla

34 cm. - Desconfiado - A menudo oculto Cuello fino - Pico largo - Cola no visible - Pardo, no castaño - Capuchón negro - Leve ápice blanco en remeras internas, visible en vuelo - Pico plumizo con mancha basal roja.

♀ Sin capuchón - Ceja y garganta blancuzcas - Pico pálido.

Ambientes acuáticos



PATO COLORADO

Anas cyanoptera

36 cm. - Recuerda a 123), incluso en diseño alar - Pico menor - Mucho más rufo - Iris rojo

♀ Algo más canela.

Ambientes acuáticos



PATO CUCHARA

Anas platalea

36 cm. - Castaño acanelado - Cabeza y cuello claros y pecas negras en dorso, pecho y flancos - Cubiertas celestes con faja blanca, notables en vuelo - Subcaudal negro con mancha blanca - Pico (6 cm.) largo, alto y ensanchado que lleva casi rozando el agua - Iris blanco

♀ Sin castaño - Iris oscuro

Ambientes acuáticos



PATO FIERRO

Oxyura dominica

30 cm. - Más confiado pero oculto - Flota semihundido entre la vegetación - No suele elevar la cola - Vuela más, mostrando una mancha central blanca en el ala - Corona, cara y barba negras, no capuchón - Dorso manchado de negro.

♀ Dos notables fajas ocráceas en cara negruzca Esteros, sabanas inundadas y lagunas (Bajos submeridionales)



PATO CAPUCHINO O FRANCISCANO*Anas versicolor*

31 cm. Amplia corona y nunca pardo oscuras Cara y garganta ocráceas Dorso manchado de negruzco Espejo verde y blanco Tercio posterior gris plateado con fino barrado negro Ventral con pecas negras Flancos barrados Pico azulado de base amarilla.

Ambientes acuáticos.

PATO GARGANTILLA*Anas bahamensis*

35 cm. - Recuerda por aspecto al Maicero - Acanelado - Cara y garganta blancas bien contrastadas - Dorso con manchas y ventral con pecas, negras Espejo verde y acanelado - Aguda cola crema Base roja en pico plumizo.

Ambientes acuáticos, a menudo salobres.

PATO MAICERO*Anas georgica*

39 cm. - Muy gregario - Nidifica en el campo - Cuello largo - Menos frente - Cola aguda - Pardo ocráceo - Corona acanelada - Dorso, pecho y flancos manchados - Garganta, cuello y resto ventral casi blancuzcos - Espejo: negro entre fajas ocre - Pico amarillo con culmen negro.

♀ Cola menos aguda.

Ambientes acuáticos y cercanías, y áreas rurales.

PATO OVERO*Anas sibilatrix*

37 cm. - Vuelo errático - A en menudo grupos - Silbo largo y trinado - Amplios frente y malar blancos - Resto de cabeza y cuello, negros con brillo verde - Dorso negro marginado de

blanco - Mancha alar y rabadilla, blancas, notables en vuelo - Flancos canelas - Ventral blanco.

♀ y jóvenes más pálidos.

Ambientes acuáticos

PATO PICASO, CRIOLLO O REAL*Cairina moschata*

65 cm. - Arisco - Posa en árboles - Sordo bufido - Semicopetón - Negro - Brillo dorsal verde - Mancha alar blanca notable en vuelo y asentado - Carúncula y periocular rojos

♀ 53 cm. - Sin carúncula

Jóvenes con leve o sin blanco alar

Esteros, ríos y pantanos, a menudo en selvas y bosques.

PATO ZAMBULLIDOR CHICO*Oxyura vittata*

31 cm. - Pico angosto en el ápice.

♀ Notable faja subocular y garganta, blancuzcas Esteros, lagunas y bañados

**PATO CUTIRÍ***Amazonetta brasiliensis*

35 cm. - Confiado - Silbo pi..uí - Pardo - Faja en corona y cuello dorsal, rabadilla, alas y cola, negro brillante - Cara y cuello lateral claros - Espejo azul - Zona triangular blanca en ápice

de remeras internas, visible en vuelo - Pico y patas rojas La hembra vuela delante del macho - Manchas loreal y supraocular y garganta blancas - Pico plumizo. Esteros, sabanas inundadas y lagunas.

**PATO CRESTUDO***Sarkidiornis melanotos*

60 cm. - Arisco - Posa en árboles - Grupos - Vuelan en fila - Inconfundible - Cabeza y cuello blancos salpicados de negro - Dorsal negro con fuerte brillo - Ventral blanco - Carúncula

negra muy notable en plumaje de reproducción

♀ 48 cm. - Sin carúncula.

Esteros, sabanas inundadas, ríos y bañados

**SIRIRÍ COLORADO***Dendrocygna bicolor*

38 cm. - Rápido y nasal tigli - Canela - Línea negra en cuello dorsal - Dorso negruzco ondeado de canela - Rabadilla blanca - Barras crema en flancos - Patas plumizas.

Ambientes acuáticos y cercanías.

**SIRIRÍ VIENTRE NEGRO***Dendrocygna autumnalis*

38 cm. - Silbo de 4 ó 5 sílabas - Cara y garganta cenicientas - Línea negra en cuello dorsal - Dorsal castaño - Faja alar blanca, más visible en vuelo - Rabadilla, vientre y abdomen, negros - Periocular blanco - Pico rojizo - Patas rosáceas.

Jóvenes sin faja alar blanca ni ventral negro.

Esteros, pantanos y áreas inundadas.

**SIRIRÍ PAMPA***Dendrocygna viduata*

38 cm. - Rápido y agudo sirirí - Garganta y mitad de cabeza, blancos, y mitad posterior negra - Cuello rufo - Alas, rabadilla y centro del vientre, negros - Flancos con fino barrado blanco y negro.

Jóvenes canela (en vez de blanco) en cabeza.

Ambientes acuáticos y cercanías y áreas rurales.



Orden Ardeiformes:

Familia ARDEIDAE:

Garzas, mirasoles - Cosmopolita - 60 especies, 13 en Argentina - Palustres - Vuelo lento con el cuello recogido - Gregarias - Vadean - La mayoría cría en colonia - 3 ó 4 huevos a menudo azul verdosos - Pico largo y agudo - Patas largas, con dedos no palmeados - ♂ y ♀ semejantes.

GARCITA BLANCA

Egretta thula



40 cm. - Grupos - Parecida - Pico negro - Patas negras con pies amarillos, Plumaje nupcial: egretes en nuca, pecho y dorso. Jóvenes: Patas amarillo verdosas. Ambientes acuáticos y cercanías.

GARZA BLANCA

Ardea alba



65 cm. - Grupos A veces en árboles - Blanca - Pico amarillo - Patas negruzcas - Plumaje nupcial: Largas egretes en dorso y pecho. Ambientes acuáticos y cercanías.

GARZA MORA

Ardea cocoi



75 cm. - Arisca - Solitaria - La mayor de las garzas - Dorso gris - Corona, largas plumas nucales, dos líneas discontinuas en el cuello y flancos pectorales negros - Resto ventral blanco. Jóvenes: Sin flancos negros. Ambientes acuáticos.

Familia CICONIIDAE:

Cigüeñas - Cosmopolita - 17 especies - 3 en Argentina - Recuerdan garzas - Más grandes y robustas - No tan gregarias ni tan palustres - Cuello extendido en vuelo - A menudo crían en colonia - 2 a 4 huevos blancos - Cabeza y cuello desnudos - Pico largo y grueso - Patas largas, con dedos no palmeados - ♂ y ♀ semejantes.

TUYUYÚ Ó DOROTEO

Mycteria americana



65 cm - Grupos - A menudo en árboles - Blanca - Cabeza y cuello negruzcos - Remeras y cola negras, notables en vuelo - Pico córneo con ápice curvo. Jóvenes: Manchado de pardo. Sabanas inundadas, esteros, lagunas y bañados.

YABIRÚ

Jabirú mycteria

1,10 m - Postura erecta - Blanca, incluso alas y cola - Cabeza y cuello negros - Ancho collar rojo - Robusto pico negro algo curvo hacia arriba. Jóvenes: Manchado de pardo - Collar rosáceo. Sabanas inundadas, esteros y bañados.



CIGÜEÑA AMERICANA Ó TUYANGO

Ciconia maguari

85 cm - Asentada, tercio posterior del cuerpo, negro. En vuelo la cola se ve blanca con laterales negros - Periocular y patas rojas - Pico recto, córneo violáceo - Iris amarillo. Jóvenes: Negro con brillo. Ambientes acuáticos y áreas rurales.



Familia THRESKIORNITHIDAE:

Bandurrias, cuervillos, espátula - Cosmopolita - 28 especies, 7 en Argentina - Recuerdan cigüeñas - Mucho menores - Gregarias - Algo palustres - Vuelo rápido con el cuello extendido; a veces formación en "V" - En general crían en colonia - 2 a 5 huevos Cuello y patas largos - Dedos no palmeados - Pico largo, delgado y curvo. ♂ y ♀ semejantes.

BANDURRIA MORA

Harpiprion caerulescens

62 cm - Trompeteo al caminar - Cenicienta - Brillo oliváceo - Frente blanca - Notable y despeinado copete nupal y cuello, estriados de blancuzco - Iris y patas rojizos. Jóvenes: más opaco. Esteros y sabanas inundadas en el N.



CUERVILLO CARA PELADA

Phimosus infuscatus

40 cm - Grupos o bandadas no muy grandes - Parecido - Más retacón - Se ve más negro y opaco - Brillo verde - En vuelo las patas rosáceas, más cortas, apenas sobrepasan la cola - Cara desnuda rosácea - Pico marfil (o rosáceo en Plumaje nupcial). Esteros, sabanas inundadas y



ESPÁTULA ROSADA

Platalea ajaja

55 cm - Grupos - Mueve su pico largo y chato de un lado a otro, mientras vadea aguas someras - También arborícela - Rosada - Por color recuerda flamencos - Cubiertas, rabadilla, mancha pectoral y subcaudal, carmín - Cola ocrácea. Jóvenes: blancuzco. Ambientes acuáticos y cercanías.



Orden Caradriformes:

Familia SCOLOPACIDAE:

Playeros, becasas, becasinas, pitotois - Cosmopolita - 82 especies, 22 en Argentina - Migradores con dimorfismo estacional - Más gregarios, costeros y de cabeza menor que Charadriidae - Vuelo rápido - Nido en el suelo - 3 a 4 huevos manchados - Esbeltos - Pico y patas a veces muy largos - Alas agudas - 4 dedos.

♂ y ♀ semejantes.

BECASINA COMÚN

Gallinago gallinago



23 cm - A veces en postes - V dorsal blancuzca u ocrácea - Cola negra con banda canela - Pecho estriado Flancos barrados - Resto ventral blanco - Pico 7 cm - Patas amarillo oliváceas.

Jóvenes: Pico más corto - Patas azuladas.

Ambientes acuáticos.

Orden Columbiformes:

Familia COLUMBIDAE:

Palomas, torcazas - Cosmopolita - 284 especies, 23 en Argentina - Inconfundibles - Caminadoras - Vuelo sostenido y ruidoso - Arrullo - 1 ó 2 huevos blancos o cremosos - Robustas - Cabeza chica, redondeada - Pico fino, corto, con cera en la base - Cuello corto - Alas largas y agudas - Patas cortas, a menudo rojizas - ♂ y ♀ semejantes.

PALOMA PICAZURÓ

Columba picazuro



34 cm - Arisca - Voz kuúu..ku..ku..kuúu - Silueta con cuello largo - Cabeza y pecho vinosos - Apretados filetes celeste metálicos en cuello dorsal - Medialuna blanca en cubiertas más notable en vuelo - Resto plumizo - Iris castaño.

Diversos ambientes, áreas rurales y poblados.

PALOMA MANCHADA

Columba maculosa



32 cm - A veces con 319) - Más confiada y plumiza - Similar voz más ronca - Cuello sin filetes - Notable ala con muchas pecas blancas - Iris gris.

Bosques, estepas arbustivas, áreas rurales y poblados.

TORCAZA

Zenaida auriculata

22 cm - Bandadas, a veces enormes - Voz kuu..kuúkuú..kau - Rosácea Brillo dorado en cuello lateral - Manchas en alas y cara, negras - Cola plumiza con faja subapical negra y ápice externo blanco. Diversos ambientes, áreas rurales y poblados.



Orden Cuculiformes:

Familia CUCULIDAE:

Cuculillos, pirinchos, anos, crespín - Cosmopolita 128 especies, 12 en Argentina - Trepadores - Varios son parásitos - Nido en árboles - Número y color de huevos variable, algunos con malla calcárea - Esbeltos - Coloración modesta - Pico algo curvo - Alas cortas - Cola larga, graduada - 2 dedos hacia adelante y 2 hacia atrás.

♂ y ♀ semejantes.

ANO CHICO

Crotophaga ani

32 cm - Confiado - En sitios visibles - Grupos bullangueros con vuelo no simultáneo, alternando rápido batido y largo planeo - Arborícola y terrícola - Bisilábico, lastimero y melodioso uuaí - Otras voces - Pico curvo, alto y comprimido - Recuerda al pirincho - Negro - Brillo violáceo - Cola azulada, larga, ancha y péndula - Flechitas tornasoladas en cuello y pecho.

Selvas, bosques, sabanas, áreas rurales y poblados.


ANO GRANDE

Crotophaga major

41 cm - Arisco - Oculito Variadas voces a coro como parloteo - Simpátricos - Mayor - Más azul - Brillo verdoso en dorso pecho - Muy larga cola violácea Iris blanco oliváceo.

Jóvenes: Iris pardo.

Selvas, bosques y sabanas cerca del agua en el N.



Orden Gruiformes:

Familia CARIAMIDAE:

Chuñas - Sud América - 2 especies, ambas en Argentina - Terrícolas - Corredoras - Grito fuerte - Nido en árboles - 2 a 3 huevos manchados - Plumaje laxo Pico como de gallina - Cuello, patas y cola largos - Alas algo cortas y redondeadas - Dedos cortos.

♂ y ♀ semejantes.

CHUÑA PATAS ROJAS

Cariama cristata

70 cm - Menos gregaria - Largo y despeinado penacho frontal - Más ocrácea - Pico y largas patas, rojos. Sabanas y bosques, incluso húmedos.



Familia **ARAMIDAE:**

Carau - América - 1 especie, que en vive en Argentina - Gritón - Palustre - Vuela con las primarias separadas - Nido oculto en bañados - Hasta 7 huevos manchados - Negruzco - Pico largo, apenas curvo - Cuello y patas largos - Alas largas y anchas - Cola corta. ♂ y ♀ semejantes.

CARAU

Aramus guarauna



54 cm - Tras la reproducción bandadas dispersas - Palustre - Terrícola y algo arboricela - Fuertes gritos krau y otros - Vuelo bajo, con súbitos aletazos de la horizontal hacia arriba - Recuerda cuervillos - Más robusto - Cuello más recto - Pardo negruzco. Pico amarillento, apenas curvo - Cuello dorsal chorreado da blanco.

Ambientes acuáticos.

Familia **RALLIDAE:**

Gallinetas, gallaretas, burritos, pollas - Cosmopolita - 120 especies, 25 en Argentina - Palustres - De día poco voladoras - Grito fuerte - Varios manchados - A veces escudete - Alas cortas y redondeadas Cola corta, a menudo erecta - Dedos largos - (Gallaretas: Acuáticas, dedos lobulados). ♂ y ♀ semejantes.

GALLARETA ESCUDETE AMARILLO

Fúlca leucoptera



30 cm - Camina bastante - La más voladora, notándose ápice de secundarias blanco - Redondeado escudete amarillo o anaranjado, sin rojo - Ambientes acuáticos.

GALLINETA COMÚN

Aramides ipecaha



27 cm - A veces sobre arbustos en matorrales acuáticos - Coros al atardecer - Plomiza - Dorso pardo oliváceo - Pico (6 cm) con manchas roja y celeste en la base - Jóvenes: Pardo - Garganta blancuzca - Pico y patas negros - Juncales y cercanías.

POLLA DE AGUA NEGRA

Gallinula chloropus



29 cm - Menos gregaria - Rítmico cabeceo al nadar - Cloqueo - Lomo recto, más bajó adelante - Discontinua línea blanca en flancos - Notable subcaudal blanco dividido - Liga, escudete y pico rojos, éste con ápice amarillo - Jóvenes: Pardo - Garganta blanca - [Pico rosáceo] - Ambientes acuáticos con vegetación.

Orden **Galliformes:**

Familia **CRACIDAE:**

Pavas de monte, yacúes - América - 43 especies, 6 en Argentina - Terrícolas y arborícolas - A menudo presa de cazadores - Anidan en árboles - 2 a 4 huevos blancos - Recuerdan pavos - Grandes - Cabeza pequeña - Zona gular y cara desnudas, coloreadas - Pico como de gallina - Alas anchas - Cola larga - Tarsos y dedos fuertes. ♂ y ♀ semejantes.

CHARATA

Ortalis canicollis

52 cm - Grito grupal cha..cha..la..có, fuerte y ronco - Pardusca - Cabeza, cuello y pecho cenicientos - Dorso algo oliváceo - Ventral ocráceo - Subcaudal y timoneras externas, rufas - Zonas ocular y guiar rojizas. Bosques y sabanas de tipo chaqueño (no selvas).



Orden **Passeriformes:**

Familia **CORVIEDAE:**

Urracas - Cosmopolita - 102 especies, 3 en Argentina - Grupos - Bullangueras - Inquietas - Nido en árboles - Varios huevos manchados - Grandes Plumaje vistoso, azulado - Pico robusto,, con "cerdas" sobre las narinas - Cola larga y redondeada. ♂ y ♀ semejantes.

URRACA COMÚN

Cyanocorax chrysops

32 cm. - Conspicua - Llamativa coloración - Corona y semicopete, negro aterciopelado - Ceja y nuca celeste liláceas - Dorso y babero negro violáceos - Ancho ápice caudal y resto ventral crema amarillento - Iris dorado. Jóvenes sin marcas celestes. Selvas, incluso en galería, capueras y bosques.



Familia **EMBERIZIDAE:**

Cardenales, corbatitas, capuchinos, jilgueros, yales, chingolos, monteritas - Cosmopolita - 315 especies, 80 en Argentina. Más bien granívoros y gregarios - Canto agradable y variado - Huevos blancos o manchados - Pico robusto, corto y cónico. ♂ y ♀ generalmente distintos - ♂ plumaje vistoso.