

JILGUERO DORADO*Sicalis flaveola*

12 cm. - Más bien en pareja - Amarillo oro - Dorso oliva estriado de negro - Frente algo anaranjada - Alas y cola negras con rebordes amarillos.

Hembras y jóvenes, distintos del macho - Sin amarillo - Dorso gris pardusco estriado de negro - Ventral blancuzco con pecho y

flancos estriados.

BRASITA DE FUEGO*Coryphospingus cucullatus*

12 cm. - Terrícola y de arbustos - Chistido *chip.* - Rojizo oscuro - Eréctil semicopete rojo brillante - Rabadilla y ventral carmín - Periocular y mandíbula blancos.

Hembra: más pálida - Sin rojo brillante.

Selvas, capueras, bosques y

sabanas.

CAPUCHINO CANELA*Sporophila minuta*

9 cm. - Corona y dorso plumizos - Rabadilla y ventral canelas, no rufos

Hembra: Diseño común.

Sabanas, pastizales y vegetación palustre..

CAPUCHINO GARGANTA NEGRA*Sporophila ruficollis*

9 cm. - Corona y dorso plumizo - Amplio babero negro - Resto ventral y rabadilla rufos.

Hembras: Diseño común.

Sabanas, pastizales, cardales y áreas rurales..

MISTO*Sicalis luteola*

12 cm. - A veces bandadas enormes que semejan enjambres - A menudo en jaula - Vuelo nupcial con caída en planeo lento - Anida en el suelo - Bisilábico *zi..ziss* - Dorsal ocráceo muy estriado de pardo - Rabadilla oliva - Párpado y ventral, amarillo.

Hembra: Similar - Más pálida -

Pecho y flancos ocráceos.

Sabanas, pastizales y áreas rurales.

PEPITERO GRIS*Saltator coerulescens*

20 cm. - Agradables y variados silbos *chiuchiú..chiú..uiiu* - Dorso plumizo - Cara gris - Corta y notable ceja blanca - Garganta blancuzca flanqueada por líneas negras - Ventral acanelado algo

ceniciento en pecho - Pico negro.

Capueras y bosques..

PEPITERO de Collar*Saltator aurantirostris*

18 cm - Repetido silbo *bich..bich..bichío* - Dorsal plumizo - Cara, lados del cuello y collar negros - Larga ceja postocular y garganta blancas o acaneladas - Ventral pardo acanelado - Pico anaranjado [con maxila negra] - Jóvenes: Pico oscuro - Bosques y sabanas.

CORBATITA COMÚN*Sporophila caerulescens*

10 cm. - A menudo en jaula - Dorso plumizo - Barba negra rodeada de blanco, collar negro y resto ventral blanco - Pico amarillento.

Hembra: Diseño común.

Sabanas, estepas arbustivas, áreas rurales y poblados.

**CORBATITA OVERO***Sporophila lineola*

10 cm. - Negro y blanco - Faja en corona, malar, rabadilla y ventral blancos.

Hembra: Diseño común.

Sabanas y bosques en el Norte..

**CORBATITA DOMINÓ***Sporophila collaris*

11 cm. - Inconfundible - Bastante palustre - Negro y canela - Corona, cola, mejillas y collar negros - Mañanitas frontal y subocular y garganta blancas -

Hembra: Garganta blanca - Rabadilla, filetes en cubiertas y resto ventral acanelados.

Pastizales, sabanas y vegetación acuática.

**MONTERITA CABEZA NEGRA***Poospiza melanoleuca*

12 cm. - Confiada - Recorredora - Repetido y sonoro *tsp* - Cabeza negra Dorso plumizo - Ventral blanco.

Hembra: Más parda - Sin cabeza negra.

Bosques, sabanas y cercanías de selvas.

**PIQUITODEORO COMÚN***Catamenia analis*

11 cm. - Plumizo - Frente y loreal negros - Banda alar, faja caudal y vientre blancos - Subcaudal rufo - Grueso pico amarillo oro - Patas oscuras - 9: Dorso pardo y ventral ocráceo, estriados - Bandas alar y caudal menos notables.

Estepas alto-andinas, chaco serrano y pastizales de altura - En invierno llanuras.

**REINAMORA GRANDE***Cyanocompsa brissonii*

16 cm. - Continua y melódica voz - Azul - Pico muy grueso, negro - Periocular, amplia frente y hombros, celeste..



Hembra y jóvenes: Dorso castaño - Ventral canela - También plumajes intermedios. Selvas, bosques y sabanas..

REY DEL BOSQUE

Pheucticus aureoventris



19 cm. - Audible y melodioso canto - Negro - Hombros y ventral desde el pecho, amarillo oro - Notables manchas alares y ápice de timoneras externas, blancas - Pico muy grueso, grisáceo.

Hembra: más pardusca - Pecho manchado.

Yungas, chaco serrano y quebradas húmedas.

SOLDADITO COMÚN

Lophospingus pusillus



12 cm. - Terrícola y arborícola - Bandadas mixtas - Copete, antifaz y garganta negros, intercalados con notable ceja y malar blancos - Resto ceniciento.

Hembras: más pardusca - Sin negro - Garganta blanca.

Bosques y sabanas de tipo

chaqueño.

VOLATINERO

Volatinia jacarina



9 cm. - Activo - Continuos y cortos saltos verticales desde su percha, emitiendo un chirrido metálico, y haciendo más notables sus axilares y tapadas blancas - Pico más agudo - Negro azulado brillante.

Hembra: Pasiva - No salta - Dorso pardo - Ventral ocráceo - Pecho

estriado - A menudo plumajes intermedios.

Sabanas, pastizales y áreas rurales..

Familia **FRINGILLIDAE:**

Cabecitanegras - Cosmopolita - 112 especies, 7 en Argentina - Gregarios - Bullangueros - Canto fino y agradable Nido en árboles o huecos - 2 a 4 huevos - Pequeños - Recuerdan Emberizidae - Pico algo más largo y agudo - Plumaje vistoso. ♂ y ♀ distintos.

CABECITANEGRA COMÚN

Carduelis magellanica



12 cm. - A menudo en jaula Agradable canto trinado - Capuchón negro que incluye pequeño babero - Dorso oliváceo apenas estriado - Rabadilla y ventral amarillos - Hembra: Más olivácea - Sin capuchón.

Diversos ambientes, áreas

rurales, arboledas y poblados.

Familia **ICTERIDAE:**

Tordos, boyeros, varilleros - 88 especies, 23 en Argentina - A menudo gregarios y bullangueros - Activos - Nido variable, a veces muy grande y colgante - Algunos crían en colonia y otros son parásitos - Varios huevos manchados - Plumaje vistoso, más bien negro - Pico cónico, recto y agudo, en general largo - Tarsos y dedos robusto. ♀ algo menor.

BOYERO PICO BLANCO

Cacicus solitarius

24 cm - Bandadas - Nidos agrupados, amenudo en palmeras y cerca del hombre - Bullicioso - Grave y raspante rae.. y otras voces, algunas musicales - Lomo y rabadilla rojos - Picomarfil - Iris celeste.

Jóvenes: Iris pardo.

Estratos medio y alto en selvas, capueras y bosques en el NE (PN Iguazú).



PECHO AMARILLO CHICO

Pseudoleistes virescens

22 cm. - Se alimenta en campos y pernocta en bañados - Chirriado y repetido chrrruí grupal Dorsal (incluso rabadilla), pecho y abdomen, pardo oliváceos " Hombros, tapadas y resto ventral amarillos.

Ambientes acuáticos con vegetación y áreas rurales.



FEDERAL

Amblyramphus holosericeus

22 cm - Fuerte uit - Trisilábico silbo melancólico - Inconfundible - Pico largo y agudo - Negro - Capuchón hasta el pecho, y piernas, anaranjado rojizo.

Jóvenes: Negro - Plumajes intermedios.

Ambientes acuáticos con vegetación..




MORAJÚ O NEGRUCHO

Molothrus bonariensis

19 cm. - Grandes bandadas - Se asienta sobre ganado - Parásita a muchas especies - Gorgoteo seguido de silbo agudo o chistido Agradable canto en vuelo - Negro - Brillo violeta.

Hembra: Gris pardusca (negra en Misiones).

Diversos ambientes, bañados y poblados.



MÚSICO

Molothrus badius

18 cm. Bandaditas - Canto grupal con voces disímiles, como ensayo orquestal - Dorso gris pardusco - Loral y cola negros Remeras rufas más notables en vuelo Ventral ceniciento.

Sabanas, bosques, áreas rurales y poblados.




PECHO COLORADO*Sturnella superciliaris*

17 cm. - El más gregario - Se exhibe sobre matas o postes - Canto en vuelo - Metálico pinng Dorso casi negro - Larga ceja blanca - Garganta, pecho y hombros, rojos.
Hembra: Inconspicúa - Ceja y garganta ocráceas - Ventral poco estriado - Pecho y hombros rosáceos.
Pastizales y áreas rurales..

CHOPÍ*Gnorimopsar chopi*

22 cm - Bandadltas - Confiado - Terrícola y arboricela - Fuertes y melodiosos silbos, otras voces y repetido chopí.., a veces grupal - Brillo sedoso - Gola que suele encrespar - Iris oscuro - Pico curvo con surcos en la mandíbula.
Bosques, sabanas, palmares y selvas en el NE.

VARILLERO CONGO*Agelaius ruficapillus*

17 cm. - Bandadas - Bullanguero Silbos musicales y notas nasales - Pico no largo -Inconspicuos corona y babero rufos.
Hembra: Dorso negruzco algo estriado de oliváceo - Sin ceja.
Vegetación acuática y cercanías.

Familia THRAUPIDAE:

Fruteros, tangarâes - 222 especies, 26 en Argentina - Arborícolas En general gregarios - Voces melodiosas - A menudo frugívoros - Nido en árboles - 2 a 4 huevos manchados - Plumaje vistoso - Pico más bien robusto y cónico - Alas agudas.

♂ y ♀ distintos.

CELESTINO COMÚN*Thraupis sayaca*


15 cm - Confiado - Serie de aspirados y agudos sh..huí - Gris celeste - Dorso más verdoso - Alas y cola celestes.
Claros de selvas, bosques, sabanas, arboledas y poblados.

FRUTERO NEGRO*Tachyphonus rufus*

17 cm - Parecido a 828) - Sin rojo - Blanco en hombros, a veces visible también posado.
Hembras: Sin estrías.
Claros en selvas, bosques y sabanas.

FUEGUERO*Piranga flava*

11 cm - Confiado - Asentado alto en sitios visibles o volando: continuo chui - Rojo anaranjado - Dorso rufo.
Hembra: Muy distinta - Amarilla - Dorso oliva - Plumajes intermedios.
Capueras, bosques y sabanas

**NARANJERO***Thraupis bonariensis*

17 cm - Arborícola - Llamativa coloración - Capuchón celeste violáceo - Loral y dorso negros - Alas y cola con filetes celestes - Rabadilla y pecho anaranjados - Ventral amarillo.

Hembras: Coloración modesta - Dorso oliváceo - Ventral ocráceo -Plumajes intermedios.
Bosques, sabanas, áreas rurales y poblados.

**TANGARÁ COMÚN***Euphonia chlorotica*

9 cm - Audible llamada de ambos sexos bi.bi - Amplia frente y ventral amarillo oro - Capuchón, incluso garganta, y dorsal, negro violáceo - Cola ventral con zonas blancas.

Selvas, bosques y sabanas.

**Familia TURDIDAE:**

Zorzales - Cosmopolita - 303 especies, 11 en Argentina - Más bien terrícolas - Balancean la cola con las alas caídas -Canto melodioso - No imitan - Nido semiesférico, a baja altura, de barro y vegetales - 3 huevos verdosos, manchados.

Recuerdan calandrias - Más ocultos y robustos - Pico casi recto - Alas largas y agudas - Tarsos fuertes.

♂ y ♀ a menudo semejantes.

ZORZAL BLANCO*Turdus amaurochalinus*

21 cm. - Canto fuerte y dulce - Voz schra - Coloración modesta Cabeza cenicienta - Inconspicuas remeras y tapadas canelas - Estriado guiar poco notable - Ventral gris acanelado uniforme (variantes individuales) - Subcaudal blancuzco - Pico oscuro.
Selvas, capueras y poblados en el NE.

**ZORZAL COLORADO***Turdus rufiventris*

23 cm - Repetido y melódico coró..chiré desde el alba - Fuerte dru..uip y otras voces - Estriado guiar que sigue en pecho - Vientre y abdomen, rufo anaranjado, más notable en plumaje nupcial - Pico amarillo en macho adulto.
Selvas, bosques, arboledas y poblados.



Familia TYRANNIDAE:

Viuditas, monjitas, benteveos, mosquetas, piojitos, fiofios - 380 especies, 122 en Argentina. Suelen cazar en vuelo elástico - Algunos agresivos - Voces, nidos y huevos variados - Pico a menudo fino, con vibras y gancho apical - Alas y tarsos largos.

♂ y ♀ generalmente semejantes.

CHURRINCHE

Pyrocephalus rubinus



13 cm - Se exhibe- Corto vuelo elástico - Suave pint, y ch..churrin en vuelo nupcial - Llamativo - Notables corona, semicopete y ventral rojos - Resto negruzco.

Henbra: Poco llamativa - Dorso gris pardusco - Pecho estriado de gris - Subcaudal rosaceo.

Jóvenes: como las hembras -

Abdomen amarillo.

Sabanas, bosques, estepas arbustivas y áreas rurales.

Orden Pelecaniformes:

Familia PHALACROCORACIDAE:

Cormoranes, biguá - Cosmopolitas - 30 especies, 6 en Argentina - Costeros - Gregarios - Zambullen y bucean - Postura erecta - A veces al sol con las alas extendidas - Crian en colonia - 4 huevos celestes - Pico recto, más bien largo, con gancho apical - Cuello largo - Cola larga, algo rígida - 4 dedos palmeados.

♂ y ♀ semejantes.

BIGUÁ

Phalacrocorax olivaceus



63 cm. - Negruzco, con brillo - Iris verde claro - Plumaje nupcial: Plumas blancas en la base del pico.

Jóvenes: Pardo - Ventral claro.

Costas del mar y ambientes acuáticos, incluso en áreas pobladas.

Orden Piciformes:

Familia RAMPHASTIDAE:

Tucanes, tucanos, arasaríes - América - 37 especies, 5 en Argentina - Arborícelas Bullangueros - Más bien en grupos - Vuelo alto, lento y ondulado - Nido en huecos de árboles - 2 a 4 huevos blancos, brillantes - Plumaje vistoso - Pico muy grande y colorido, comprimido, con bordes aserrados - Alas cortas - Cola larga que apoyan en la cabeza al dormir - Dedos largos, 2 hacia adelante y 2 hacia atrás.

♂ y ♀ semejantes.

TUCÁN GRANDE

Ramphastos toco

53 cm. - Grupos bullangueros - Conspicuo - Fuerte y nasal krrroc que recuerda al del carancho - Negro - Rabadilla y babero, blancos - Zona periocular anaranjada - Subcaudal rojo - Gran pico anaranjado y amarillo con ápice negro - Jóvenes: Pico sin negro apical.

Selvas, bosques y capueras en el NO y NE.



Orden Psittaciformes:

Familia PSITTACIDAE:

Loros, aras, guacamayos, cotorras, catas - Cosmopolita - 327 especies, unas 24 en Argentina - Inconfundibles - Bullangueros - Trepadores - Vuelo rápido y batido - Más bien gregarios - Nido en huecos - 2 a 6 huevos blancos - Verdes - Cabeza grande Pico robusto y muy curvo - Alas largas y agudas - Patas cortas - 2 dedos hacia adelante y 2 hacia atrás.

♂ y ♀ semejantes.

CALANCATE ALA ROJA

Aratinga leucophthalma

33 cm - Voz tschirri - Verde claro - Sin rojo ni azul en la frente - Algunas plumas rojas en la cabeza -Hombros, y tapadas rojas, juego amarillas, notables en vuelo - Jóvenes: sin rojo.

Selvas, bosques y sabanas.



CALANCATE COMÚN

Aratinga acuticaudata

35 cm - Capuchón azulado - Base roja en cola ventral visible al abrirla y en vuelo - Iris anaranjado.



COTORRA

Myiopsitta monacha

27 cm - Muy conocida - A menudo en jaula o suelta, como mascota Bandadas bullangueras - Vive y cría en grandes nidos comunales de palitos - Verde - Amplia frente y garganta grises - Pecho ceniciento ondeado de blancuzco Remeras azules - Pico anaranjado.

Bosques, arboledas, sabanas, áreas rurales y poblados.



Mamíferos

Orden **Carnívora:**

Familia: **Canidae**

Aguará guazú

Chrysocyon brachyurus



Es el mayor de los cánidos de sudamérica. - Prefiere las praderas y los pastizales en zonas inundables. - Alcanza los 75 cm. de altura a la cruz, y hasta los 130 cm. de longitud, a los que hay que sumar unos 40 de cola. Puede superar los 20 Kg. de peso. - El pelaje es largo y tupido, de color rojizo, más largo en la región del cuello, con el vientre más claro. Presenta marcas negras en el hocico, las extremidades y a lo largo de la espina dorsal, así como otras blancas en la garganta, el interior de las oreja y ocasionalmente en el extremo de la cola.

Las patas largas lo dotan de una visibilidad superior en las regiones de pastos altos en las que habita. Como la hiena, mueve las extremidades de un mismo lado al caminar, dejando una huella distintiva.

Se mantiene por lo general oculto durante el día; caza preferentemente en horario crepuscular, aunque está también activo de noche.

Es omnívoro, y obtiene la mayor parte de sus calorías de frutos y raíces tiernas; sin embargo, son buenos cazadores. Acechan su presa roedores pequeños, especialmente conejos, liebres y cuisés, además de lagartos, ranas y aves para matarla de improviso; comen también huevos de aves y reptiles, y de ser necesario carroña. La dentición refleja sus hábitos alimentarios, mostrando molares bien desarrollados e incisivos superiores relativamente débiles.

Son fuertemente territoriales. Los cachorros, que nacen tras dos meses de gestación. Una camada habitual tiene dos o tres ejemplares, aunque en cautiverio se han registrado hasta seis nacimientos. Se comunica a la distancia mediante ladridos roncros y graves.

Zorro de monte

Cerdocyon thous

En promedio, su longitud total es de 70 cm y la de su cola de 35 cm. Puede pesar de 5 a 9 kg. - Su manto es gris y castaño, compuesto por una mezcla de pelos negros, grises, castaños, amarillentos y blancos, siendo más negro del lomo y la cola. - Es monógamo y territorial. - La gestación dura 52 a 60 días, dando a luz 3 a 5 crías por camada. - Su dieta es estacional. Caza roedores, cangrejos, ranas, reptiles, aves, tortugas e insectos, y además consume huevos, carroña y algunos vegetales, semillas y frutos.



Orden **Artiodactyla:**

Familia: **Cervidae**

Venado de las pampas

Ozotoceros bezoarticus



La coloración del pelaje es bayo o crema claro, variando a pardo, anaranjado o rojizo. - El blanco se destaca en el extremo de la mandíbula. en el labio superior, la región periocular, la cara interna de las orejas, la parte inferior del cuello, la región ventral, la parte posterior de los muslos y la porción ventral de la cola. - Los cervatillos presentan una coloración más clara, con tres o cuatro hileras de manchas blancas en los flancos. - En la cabeza se destacan los grandes ojos, las orejas erguidas y en el macho, dos astas o cuernos delgados, con tres puntas cada una, de estas ramificaciones, una es simple y está dirigida hacia adelante, la otra hacia atrás, bifurcada en dos puntas en la parte superior.

La hembra carece de astas, es de menor tamaño y de pelaje más claro.

La altura en la cruz es de unos 65-70 cm., y llegan a pesar 35-40 kgs.

Luego de los 7 meses de gestación nace un cervatillo por hembra.

Vive en praderas con pastizales, sin vegetación arbórea o con isletas de arbustos o de árboles.

Guazuncho

Mazama gouazoubira



Tanto machos como hembras alcanzan entre 55 y 65 cm de altura a la cruz, y hasta 110 cm de longitud. - Su peso llega a los 30 kg. - La coloración varía de pardogrisácea a pardorojiza, con un matiz gris que lo distingue de otras especies. - El juvenil es más oscuro, con manchas blancas en flancos y lomo. - A partir del año de vida los machos desarrollan una cornamenta sin ramificar que alcanza los 15 cm de longitud.

Habita normalmente en zonas boscosas, abiertas o semiabiertas. Se alimenta de brotes tiernos, hojas, hongos y frutos.

La gestación dura unos 220 días, y concluye con el parto de una única cría.